

**ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À SAÚDE**

**ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL DE USO ORAL PARA GATOS**

### Fórmula:

Cada comprimido de **Flamavet 0,2 mg** contém:

Meloxicam ..... 0,2 mg

Excipientes (\*) .....q.s.p..... 60 mg

**\*contém palatibilizante**

### Informações técnicas:

**Flamavet** é um anti-inflamatório à base de meloxicam, classificado com anti-inflamatório não esteroideal (AINE), que possui atividade analgésica e antipirética. Pertence à classe do ácido enólico, um dos derivados de Oxiam. Esta classe de fármacos inibe a atividade da enzima ciclo-oxigenase (COX), da fosfolipase A2 e da síntese de prostaglandinas. O **Flamavet** apresenta atividade seletiva para COX-2, proporcionando os efeitos terapêuticos dos anti-inflamatórios não esteroidais, enquanto a inibição da COX-1 é responsável pelos efeitos colaterais gástricos e renais.

### Indicações:

**Flamavet** é indicado como anti-inflamatório e analgésico para gatos.

### Posologia e modo de usar:

O produto deve ser administrado exclusivamente pela via oral.

Administrar o comprimido uma vez ao dia, em dosagem de acordo com a tabela abaixo:

Dosagem	Primeiro dia de tratamento	2º dia e tratamentos subsequentes
<b>Flamavet 0,2 mg</b>	1 comprimido para cada 2 kg de peso corporal (0,1mg de meloxicam / kg de peso corporal)	½ comprimido para cada 2 kg de peso corporal (0,05mg de meloxicam / kg de peso corporal)

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro. Para tratamento em gatos adultos pode ser indicada terapia prolongada por até 21 dias consecutivos, ou a critério do Médico Veterinário.

### Contraindicações:

O produto não deve ser administrado em animais com antecedentes de hipersensibilidade ao meloxicam ou qualquer um dos componentes da fórmula.

Não administrar o produto aos animais com histórico de ulceração gastrointestinal ativa. Deve ser utilizado com cautela em pacientes hepatopatas, cardiopatas, doentes renais e com distúrbios hematológicos.

### Interações medicamentosas:

Não administrar o **Flamavet** junto com outros anti-inflamatórios esteroidais ou não esteroidais e anticoagulantes devido ao maior risco de toxicidade gastrointestinal e sangramentos. Não utilizar com as medicações: digoxina, fluconazol, metotrexato e drogas nefrotóxicas como furosemida, antibióticos aminoglicosídeos, entre outros. Alguns AINES podem reduzir o efeito dos inibidores da ECA sobre a pressão arterial e aumentar o risco de nefrotoxicidade.

### Efeitos adversos:

Os efeitos adversos mais comumente relatados são náuseas, perda de apetite, apatia, diarreia, melena e ulceração gástrica. Elevação de enzimas hepáticas, prurido, azotemia, aumento da creatinina e falência renal também já foram descritos.

70 mm

70 mm

70 mm

### **Intoxicação e Superdosagem:**

No caso de intoxicação e superdosagem, realizar o tratamento suporte e sintomático, a critério do médico veterinário.

### **Precauções:**

Produto de uso veterinário devem ser mantidos fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas ou produtos de higiene pessoal.

Produto não deve ser utilizado em fêmeas prenhes ou lactantes, e em animais com idade inferior a 12 meses.

### **Apresentação:**

Blister com 10 comprimidos na apresentação de 0,2 mg e display contendo 5 blisters com 10 comprimidos de 0,2 mg.

Conservar em local seco, a temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

## **VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
sob o nº SP 000292-5.000029 em 18/03/2021.

Responsável Técnico:  
Vânia N. A. de Carvalho  
CRF-SP nº 32.871



Proprietário e Fabricante:  
**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**  
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90  
Embu-Guaçu - São Paulo - CEP: 06900-000  
DDG: 0800 701 1799 - CNPJ: 60.665.981/0001-18  
Indústria Brasileira

4027053 - 150 x 250 mm - Laetus 247



70 mm