

**ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE
DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUÍNOS E EQUINOS TRATADOS.
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O
CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS
ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE
ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

FÓRMULA:

Ocitocina sintética padronizada.....10 UI

Veículo.....q.s.p.....1mL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

PLACENTEX é um produto à base de ocitocina sintética, que é uma substância dotada das mesmas propriedades químicas, farmacológicas e fisiológicas da ocitocina natural, produzida pelo lobo posterior da hipófise.

A ocitocina tem ação seletiva sobre a musculatura lisa do útero e dos alvéolos e canais galactóforos, estimulando e reforçando as suas contrações.

Consequentemente, facilita o trabalho de parto, a expulsão da placenta e a secreção do leite, promovendo um esvaziamento mais completo do úbere.

Pelo fato de não ter ação sobre o peristaltismo intestinal nem sobre o sistema circulatório, e por não ter ação cumulativa, a aplicação do produto poderá ser repetida sem qualquer risco à saúde do animal.

INDICAÇÕES E MODO DE USAR:

1. Retenção de placenta, atonia do útero e em casos tardios de retenção de placenta.
2. Em casos de retenção do leite, após o parto: injeção subcutânea. Após 5 a 10 minutos, iniciar lenta e progressivamente a ordenha.
3. Na insuficiência contrátil primária ou secundária da musculatura uterina durante o parto.
4. Como medicação auxiliar para encurtar o período de expulsão do feto e placenta por meio da injeção subcutânea.

POSOLOGIA:

Espécie	Dosagem	
	Subcutânea	Intravenosa
Éguas e vacas	2 - 4 mL	1,5 - 4 mL
Porcas até 250 kg	1 - 2 mL	1 mL
Porcas acima de 250 kg	3 mL	1 - 2 mL
Ovelhas e cabras	0,3 - 1,5 mL	0,2 - 1 mL

Apresentação:

Frascos-ampola de vidro âmbar de 50 mL acondicionados em cartuchos individualmente.

Frascos-ampola de vidro âmbar de 100 mL acondicionados em cartuchos individualmente.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Período de validade: Em sua embalagem original fechada a validade do produto é de 36 meses após a fabricação.

Após aberto, o produto deve ser utilizado em até 30 dias.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP no 32.871

Licenciado no Ministério da Agricultura
sob nº SP 000292-5.000040 em 09/08/1983



Proprietário e Fabricante:
UNIAO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90

Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-095

DDG: 0800 701 1799

CNPJ: 60.665.981/0001-18

® Marca Registrada - Indústria Brasileira

4032321 - 100 x 150 mm - Laetus 325

