

ENDECTOCIDA PARA BOVINOS E OVINOS

ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 34 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM BOVINOS PRODUTORES DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

OVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 35 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM OVINOS PRODUTORES DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

PROIBIDO O USO DESTE PRODUTO EM BOVINOS DE CORTE CRIADOS EM REGIME DE CONFINAMENTOS, SEMI-CONFINAMENTOS E EM REGIME EXTENSIVO NA FASE DE TERMINAÇÃO

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Doramectina1,0 g

Veículoq.s.p.....100,00 mL

Informações técnicas:

A doramectina é uma lactona macrocíclica da família das avermectinas, produto de fermentação do *Streptomyces avermectilis*, derivada por síntese mutacional.

O produto controla com alta eficiência e ampla margem de segurança endo e ectoparasitas simultaneamente.

Indicações:

Bovinos:

DORAX 1 % é indicado no controle das formas adultas e larvas de 4º estágio dos seguintes nematódeos gastrintestinais: *Ostertagia ostertagi* (incluindo larvas hipobioticas), *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *C. punctata* e *Oesophagostomum radiatum*. Também é indicado no controle das formas adultas de *Haemonchus contortus*, *H. similis*, *Trichostrongylus longispicularis*, *Cooperia pectinata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Strongyloides papillosus* e *Trichuris* spp., bem como no controle de formas adultas e larvas de 4º estágio do nematódeo pulmonar *Dictyocaulus viviparus*.

DORAX 1 % também é indicado no controle de ectoparasitos de bovinos tais como bernes (larvas de *Dermatobia hominis*), piolhos (*Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenoptes capillatus*), ácaros da sarna (*Psoroptes bovis*), na prevenção das bicheiras (larvas de *Cochliomyia hominivorax*) e como auxiliar no controle de carrapatos (*Boophilus microplus*).

Ovinos:

DORAX 1 % é indicado no controle de formas adultas dos seguintes nematódeos gastrintestinais: *Haemonchus contortus*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *C. punctata* e *Nematodirus spathiger*.

DORAX 1 % também é indicado na prevenção das miases (bicheiras) causadas por *Cochliomyia hominivorax*, bernes (larvas de *Dermatobia hominis*), "bicho-da-cabeça" (larvas de *Oestrus ovis*) e ácaro da sarna (*Psoroptes ovis*).

Posologia e modo de usar:

Bovinos:

Deve-se administrar em dose única, por via subcutânea ou intramuscular, 0,2 mg de doramectina por kg de peso corporal, ou seja, 1 mL de **DORAX 1 %** para cada 50 kg de peso, de acordo com a tabela a seguir. A aplicação deve ser feita na região do pescoço na área de pele solta na frente ou atrás da paleta (via subcutânea) ou no pescoço (via intramuscular).

| Bovinos | |
|-----------|-----------|
| Peso (kg) | Dose (mL) |
| 50 | 1,0 |
| 100 | 2,0 |
| 150 | 3,0 |
| 200 | 4,0 |
| 250 | 5,0 |

| | |
|-----|------|
| 300 | 6,0 |
| 350 | 7,0 |
| 400 | 8,0 |
| 500 | 10,0 |

Ovinos:

Deve-se administrar em dose única, por via subcutânea ou intramuscular, 0,2 mg de doramectina por kg de peso corporal, ou seja, 1 mL de **DORAX 1 %** para cada 50 kg de peso, de acordo com a tabela a seguir.

A aplicação deve ser feita na região da axila, onde não há lâ (via subcutânea) ou na anca (via intramuscular).

| Ovinos | |
|-----------|-----------|
| Peso (kg) | Dose (mL) |
| 10 | 0,2 |
| 20 | 0,4 |
| 30 | 0,6 |
| 40 | 0,8 |
| 50 | 1,0 |
| 60 | 1,2 |
| 70 | 1,4 |
| 80 | 1,6 |
| 90 | 1,8 |

Para o tratamento dos ácaros da sarna em ovinos, deve-se administrar 0,3 mg/kg de doramectina por kg de peso corporal, ou seja, 1 mL para cada 33 kg de peso.

Contra-indicações:

O produto não deve ser administrado a vacas leiteiras com 20 meses de idade ou mais.

O produto não deve ser utilizado em bezerros destinados a vitela.

Precauções:

Siga as práticas usuais de assepsia para injeções subcutâneas e intramusculares.

Em áreas de alta incidência de infecções por *Clostridium*, recomenda-se a vacinação dos animais quando são utilizados produtos injetáveis.

Evite fumar, comer ou beber durante a administração do produto. Lave as mãos após o manuseio.

Período de carência:

Recomenda-se que os bovinos cuja carne seja destinada ao consumo humano somente sejam abatidos 34 dias após a última administração do produto.

Recomenda-se que os ovinos cuja carne seja destinada ao consumo humano somente sejam abatidos 35 dias após a última administração do produto.

Apresentação:

Frascos-ampola com 50 mL, 200 mL, 500 mL e 1 L.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO
SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 000292-5.000054 em 18/03/2008.

Responsável Técnico:

Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871



SAÚDE ANIMAL

Proprietário e Fabricante:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90

Embu-Guaçu – São Paulo – CEP: 06900-095

DDG: 0800 701 1799 – CNPJ: 60.665.981/0001-18

Indústria Brasileira

4034240 - 90 x 150 mm - Laetus 1065

