



Gaviz[®]V
Omeprazol
USO VETERINÁRIO

ANTIÁCIDO PARA CÃES E GATOS

Fórmula:

Cada comprimido de 85 mg contém:	
Omeprazol	5,00 mg
Excipiente q.s.p.	85,00 mg

Cada comprimido de 170 mg contém:	
Omeprazol	10,00 mg
Excipiente q.s.p.	170,00 mg

Cada comprimido de 340 mg contém:	
Omeprazol	20,00 mg
Excipiente q.s.p.	340,00 mg

Informações técnicas:

Omeprazol atua por meio da inativação prolongada ou bloqueio das bombas de prótons (H⁺/K⁺-ATPase) localizada na membrana das células parietais gástricas, tendo como resultado a redução da secreção de ácido clorídrico e o consequente aumento do pH do estômago. Após administração oral, o omeprazol é rapidamente absorvido no trato gastrointestinal e extensivamente metabolizado no fígado pelo sistema microsomal P-450 em diferentes metabólitos, os quais são excretados principalmente na urina, e via bile e fezes.

Indicações:

Cães e gatos:

Gaviz[®] V é um antiácido indicado para o tratamento e prevenção de lesões gástricas (hiperemia, edema, erosões e úlceras) e esofágicas causadas pelo refluxo gástrico em cães e gatos. Em cães, também é indicado nos tratamentos de lesões induzidas pelo uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs).

Posologia e modo de usar:

Gaviz[®] V deve ser administrado por via oral em cães ou gatos, na dose de 0,7 a 1,0 mg / Kg de peso vivo, a cada 24 horas, durante 28 dias consecutivos, conforme tabela abaixo:

Espécie	Dosagem*	Frequência de administração*	Via de administração
Cães	0,7 a 1,0 mg / Kg de peso vivo	A cada 24 horas, durante 28 dias consecutivos	Oral
Gatos	0,7 a 1,0 mg / Kg de peso vivo	A cada 24 horas, durante 28 dias consecutivos	Oral

*A critério do médico veterinário a dose e o tempo de uso podem ser ajustados ao longo do tratamento de acordo com a necessidade dos animais.

Peso do animal	Quantidade de Gaviz V 5 mg	Quantidade de Gaviz V 10 mg	Quantidade de Gaviz V 20 mg
Até 5 kg	1		
5,1 a 10 kg		1	
10,1 a 20 kg			1

Contraindicações:

Não utilizar medicamentos após a data de vencimento.

Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Não administrar em cães ou gatos com menos de um ano de idade, fêmeas prenhes ou lactantes, visto a ausência de estudos de segurança nestas categorias.



Interações medicamentosas:

A administração de omeprazol simultaneamente com antifúngicos da classe dos azóis (como por exemplo o cetocanazol e o itraconazol), ampicilina, digoxina, ferro e micofenolato podem comprometer a absorção destas substâncias, devido à redução da acidez no lúmen gástrico causada pelos inibidores da bomba de prótons.

Em humanos, o tratamento concomitante do omeprazol com a claritromicina eleva as concentrações plasmáticas de ambas as drogas

Como o omeprazol é metabolizado no fígado por meio do sistema microsomal P-450, pode ocorrer retardo na eliminação de algumas drogas que são substratos deste sistema enzimático, tais como diazepam, varfarina e fenitoína.

Não há interação com o metronidazol e a amoxicilina. Esses antibióticos são utilizados em associação com o omeprazol no tratamento de erradicação do *Helicobacter spp.* O omeprazol pode reduzir o metabolismo da ciclosporina e do clopidogrel e reduzir a absorção da cianocobalamina (vitamina B12).

Efeitos adversos:

O produto Gaviz[®] V não apresentou efeitos adversos nos estudos de eficácia e segurança, quando utilizado nas espécies e dosagens indicadas.

Na literatura o efeito adverso mais comumente reportado em cães é a diarreia, em gatos este efeito adverso não foi reportado.

De acordo com a literatura, em humanos podem ser observados efeitos adversos gastrointestinais como anorexia, cólica, náuseas, vômitos, flatulência, diarreia e constipação; bem como anormalidades hematológicas, proteinúria, erupções cutâneas e dor abdominal.

Precauções:

Uso exclusivo em cães e gatos na posologia indicada em bula.

Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.

Em pacientes com doenças hepáticas ou renais, a meia-vida da droga pode ser prolongada e ajustes de dose podem ser necessários de acordo com a severidade da doença.

O uso prolongado do produto (acima de 8 semanas) pode gerar hipergastrinemia e hiperplasia reversível da mucosa gástrica em cães e gatos.

É indicada a redução gradual da dose após o tratamento por período superior a 4 semanas.

Manter o produto em sua embalagem original.

Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico veterinário imediatamente levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Superdosagem

Não foram realizados, em cães e gatos, estudos de superdosagem do produto.

Apresentação:

Display contendo 5 strips com 10 comprimidos cada.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n° SP 000292-5.000079 em 16/05/2003.

Responsável Técnico:
Vânia Nazaré Alves de Carvalho
CRF-SP 32.871



Proprietário e Fabricante:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A.

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, nº 90
Embu-Guaçu / São Paulo – CEP: 06900-095
DDG: 0800 701 1799
CNPJ: 60.665.981/0001-18

® Marca Registrada - Indústria Brasileira

