

Cipertróide POUR-ON

CIPERMETRINA 5%
USO VETERINÁRIO



Mosquicida para Bovinos

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 16 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DO PRODUTO.
LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 12 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL, IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cipermetrina	5,0 g
Veículo.....q.s.p	100,0 mL

Indicações:

Cipertróide® Pour On é um mosquicida indicado para o tratamento de infestações causadas por *Haematobia irritans* (mosca dos chifres) e *Musca domestica* (mosca doméstica) em bovinos.

Posologia e modo de usar:

Cipertróide® Pour On é um mosquicida indicado para bovinos e deve ser administrado exclusivamente pela via tópica (pour on) de acordo com as seguintes tabelas:

Espécie	Dosagem*	Via	Tratamento
Bovinos	1,0 mL / 10 Kg de peso vivo	Tópico (Pour On)	Dose única

*Equivalente a 5 mg de cipermetrina por Kg de peso vivo

TABELA DE DOSES

Peso Corporal (kg)	Dose (mL)	Equivalente a (mg cipermetrina)
100	10	500
200	20	1000
300	30	1500
400	40	2000
500	50	2500

Tratamento em dose única ou a critério do médico veterinário de acordo com o manejo sanitário do rebanho.

Produto pronto para uso. Aplicar ao longo do dorso do animal, desde a região cervical (cupim) até a porção lombar (inserção da cauda).

Efeitos adversos:

Raramente podem ser observados os seguintes efeitos adversos: coreoatetose, salivação, diarreia com fezes pastosas ou aquosas, hiperexcitabilidade, movimento de pedalar, ataxia, tremores, convulsões, incoordenação e desorientação, prostração e morte.

Limitações de uso:

Não tratar animais doentes ou convalescentes.
Não utilizar o produto em animais com idade inferior a 15 meses e em fêmeas prenhes e/ou lactantes.

Precauções:

Uso exclusivo pela via tópica (pour on) em bovinos na posologia indicada em bula.
Evitar aplicação do produto em dias de sol intenso ou em dias chuvosos.
Evitar o contato com os olhos, a pele e as mucosas.
Não guarde ou aplique junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.
Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.
Após a aplicação, o operador deve lavar as mãos com água em abundância e sabão.
Não misturar com outros produtos.
Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Não perfurar a embalagem.
Descartar, as embalagens vazias e restos de produto, bem como limpar os equipamentos ou recipientes usados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente.
Não contamine coleções de água de qualquer natureza.
Produto tóxico para peixes, pássaros e abelhas.



MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Tratamento de contaminação acidental:

Grupo químico: Piretroide.

Em caso de intoxicação humana ou animal, procurar auxílio médico ou médico veterinário imediatamente, levando a embalagem do produto.

Remover imediatamente as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas do corpo com água e sabão.

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo.

Não há antídoto específico, o tratamento deverá ser sintomático.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15° a 30°C), ao abrigo da luz solar direta.

Após abertura do frasco, o conteúdo deve ser utilizado em 120 dias.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.485 em 03/08/98
A FISPQ deste produto poderá ser obtida junto ao DDG.

Apresentação:

Frasco plástico com dosador contendo 2 L.

Proprietário:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.

Rua: Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 - Embu-Guaçu - SP

CEP: 06900-095 - DDG: 0800 701 1799

CNPJ: 60.665.981/0001-18

@ Marca Registrada - Indústria Brasileira.

Fabricante:

Ipanema Ind. de Prod. Veterinários Ltda.

End.: Rod. Raposo Tavares, KM 113

Barreiro/Araçoiaba da Serra - SP - CEP: 18190-000

CNPJ: 64.687.015/0001-52 - INSCR. EST.: 178.005.260.113

Cipertróide

POUR-ON

CIPERMETRINA 5%
USO VETERINARIO



Mosquicida para Bovinos

ATENCIÓN - OBEDECER LOS SIGUIENTES TIEMPO DE RETIRO: BOVINOS:

SACRIFICIO - EL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES TRATADOS CON ESTE PRODUCTO SOLAMENTE DEBE SER REALIZADO 16 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN DEL PRODUCTO. LECHE - LA LECHE DE LOS ANIMALES TRATADOS CON ESTE PRODUCTO NO DEBE DESTINARSE AL CONSUMO HUMANO HASTA 12 HORAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

EL USO DEL PRODUCTO EN CONDICIONES DISTINTAS DE LAS INDICADAS EN ESTE PROSPECTO PUEDE CAUSAR LA PRESENCIA DE RESIDUOS ARRIBA DE LOS LÍMITES APROBADOS, HACIENDO CON QUE EL ALIMENTO DE ORIGEN ANIMAL SEA IMPROPIO PARA CONSUMO.

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:

Cipermetrina	5,0 g
Vehículo c.s.p.....	100,0 mL

Indicaciones:

Cipertróide Pour On es un mosquicida indicado para el tratamiento de infestaciones causadas por *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos) y *Musca domestica* (mosca doméstica) en bovinos.

Posología y Modo de Empleo:

Cipertróide Pour On es un mosquicida indicado para bovinos y debe ser administrado exclusivamente por vía tópica (pour on) de acuerdo con las siguientes tablas:

Especie	Dosificación*	Vía	Tratamiento
Bovinos	1,0 mL / 10 Kg de peso	Tópico (Pour On)	Dosis única

*Equivalente a 5 mg de cipermetrina por Kg de peso vivo

TABLA DE DOSIS

Peso Corporal (kg)	Dosis (mL)	Equivalente a (mg cipermetrina)
100	10	500
200	20	1000
300	30	1500
400	40	2000
500	50	2500

Tratamiento en una sola dosis o a criterio del veterinario según la gestión sanitaria del rebaño. Solución lista para usar. Aplicar a lo largo del dorso del animal, desde la cruz hasta la base de la cola.

Efectos adversos:

Raramente pueden observarse los siguientes efectos adversos: coreoatetosis, salivación, diarrea con heces blandas o acuosas, hiperexcitabilidad, movimiento de pedaleo, ataxia, temblores, convulsiones, incoordinación y desorientación, postración y, en casos de intoxicación severa, muerte.

Limitaciones de uso:

No tratar a los animales enfermos o convalecientes.
No utilizar el producto en animales menores de 15 meses y en hembras gestantes y/o lactantes.

Precauciones:

Utilizar exclusivamente por vía tópica (pour on) en bovinos en la posología indicada en el prospecto.
Evitar aplicar el producto en días de sol intenso o de lluvia.
No mezclar con otros productos, especialmente fenilpirazoles, organofosforados y carbamatos.
Evitar el contacto con los ojos, piel y mucosas.
No almacenar ni aplicar cerca de alimentos, bebidas, medicamentos, productos de higiene o del hogar.
No comer, beber o fumar durante la aplicación.
Tras la aplicación, el operario debe lavarse las manos con abundante agua y jabón.
Mantener el producto en su embalaje original. No reutilizar los embalajes. No perforar el embalaje. Desechar los embalajes vacíos y restos de producto, así como limpiar equipos o recipientes utilizados de manera segura, evitando la contaminación del medio ambiente.
No contaminar las colecciones de agua de ningún tipo.
Producto tóxico para los peces, las aves y las abejas.



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

Tratamiento de la contaminación accidental:

Grupo químico: Piretroide.
En caso de intoxicación humana o animal, buscar inmediatamente asistencia médica o veterinaria, llevando el embalaje del producto.

Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lave las partes del cuerpo afectadas con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lavar con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico, llevando el embalaje o la etiqueta.

No existe un antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático.

Presentación:

Botella conteniendo 2 L

VENTA MEDIANTE PRESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN MEDIANTE ORIENTACIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO.

Almacenar en un lugar seco y a temperatura ambiente (15°C a 30°C), lejos de la luz solar directa.

Después de la apertura de la botella, el contenido debe ser utilizado hasta 120 días.

La Hoja de Seguridad de este producto podrá ser obtenida junto al DDG.

Propietario:

UNIAO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A.

Rua: Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 - Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-095

DDG: 0800 701 1799 - CNPJ: 60.665.981/0001-18

Responsable Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP n.º 32.871

@ Marca Registrada - Industria Brasileña

Fabricante: Ipanema Ind. de Prod. Veterinários Ltda.

Dirección: Rod. Raposo Tavares, KM 113

Barreiro/Araçoiaba da Serra - SP - CEP: 18190-000

CNPJ: 64.687.015/0001-52 - INSCR. EST.: 178005260113

Importadores y Distribuidores:

REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES Y ASESORÍAS VETERINARIAS, SA - REDAV S.A.

Caracas, Republica Bolivariana de Venezuela - RIF J-29574913-9

VENEZOLANA DE ALIMENTOS BB C.A.

El Limón, Aragua, Republica Bolivariana de Venezuela

RIF J-31182118-0

Nº Registro: INSAI2041PI01110523680

Asesor Técnico: MV Nerina Alliegro - C.M.V. DC Nº 449

Importador y Distribuidor:

SERVI INSUMOS BOLÍVIA IMPORT EXPORT SRL.
SENASAG Reg PUV: Nº

Importador e Distribuidor

JORBE ASESORES S.A.C - Rue 20556237086

Calle Curazao Mz G, lote 09 - Urb. Jahuary, Lurin

Registro SENASA Nº.....

