### Fórmula

Cada 100 mL contém: Cloreto de benzalcônio Veículo q. s. p. ......

Indicações: HYSTERIL é um desinfetante de superficie com ação sobre Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonela spp, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosas, Tricophyton mentagrophytes, Malassezia pachydermatis e Microsporum canis. É indicado para a desinfecção e desodorização de instalações, equipamentos e utensilios em clínicas e hospitais veterinários, canis,

gatis e salas de banho e tosa

Posologia e modo de usar: HYSTERIL deve ser usado diluído em água na proporção de 1:400.

## Dosagem prática:

Volume de HYSTERIL	Volume de água
5 mL	2 Litros
10 mL	4 Litros
25 mL	10 Litros
50 mL	20 Litros

# Instruções de uso:

- Instruções de uso:

  1 Antes de iniciar a aplicação da solução desinfetante, recomenda-se a lavagem prévia das instalações e utensílios a serem desinfetados para reduzir a matéria orgânica que pode inibir a ação do produto.

  2 Para assegurar uma maior eficiência do produto, preparar uma nova solução desinfetante no momento do uso. Não usar soluções preparadas após decorridas 24 horas da diluição do produto.

  3 Retirar a tampa do dosador, mantendo a tampa do frasco fechada.

  4 Pressionar o frasco, visualizando no dosador o volume a ser utilizado.

  5 Adicione o produto diretamente na água, homogeneizando bem.

  6 Feita a aplicação, a solução desinfetante deve permanecer em contato com as superfícies a serem desinfetadas por um período mínimo de 15 minutos, não havendo a necessidade de ser removida após este período.

  Precauções:

Precauções:

• HYSTERIL em solução concentrada pode ser irritante para pele e mucosas. Ao manipular o produto, use luvas impermeáveis e evite o contato dele com os olhos, pele ou roupas. Havendo contato, lavar

- com água corrente e procurar orientação médica, levando consigo a embalagem do produto. Em caso de ingestão acidental, procure um médico imediatamente.

   O contato direto dos animais com o produto concentrado pode causar intoxicações e infrações na pele dos mesmos, principalmente em gatos. Os sintomas em caso de ingestão do produto são: náuseas, vômito, insônia, fraqueza, dispeneia, corvuidões e coma. Em caso de ingestão acidental, procurar o médico veterinário imediatamente.

   Somente para uso em instalações, equipamentos e utensílios. Não aplicar o produto ou solução desinfetante nos animais.

   Não usar o produto em presença de sabões e outros defergentes aniónicos e nitratos, pois estes podem diminuir a sau eficada.

   Produto fóxico para organismos aquáticos. Não descartar a embalagem ou restos do produto em mananciais de água.

   Após aberto, o produto hysterií e estával por um periodo de 3 (três) meses quando armazenado em temperatura ambiente (15 a 30°C) e ao abrigo da luz solar.

   Após diluído em água conforme indicação de bula, o produto Hysterií e estável por um periodo de 24 horas em temperatura ambiente (15 a 30°C) e ao abrigo da luz solar. A presença de cloro na água não interfere na estabilidade de produto em solução.

CONSERVAR O PRODUTO NA EMBALAGEM ORIGINAL, EM TEMPERATURA ENTRE (15 A 30°C) AO ABRIGO DA LLIZ SOLAR DIRETA EFORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

# VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Apresentação: Frasco dosador contendo 1 litro. Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.857 em 30/04/2004

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho CRF-SP nº 32.871

Proprietário e Fabricante: União Química Farmacêutica Nacional S/A Rua Cel, Luiz Tenório de Brito, nº 90 CEP: 06900-000 - Embu-Guaçu - SP CNPJ: 60.665.981/0001-18 DDG: 0800 701 1799





4007618 - 100 x 100 mm