



EMULSÃO OTOLÓGICA ANTIBACTERIANA, ANTIMICÓTICA  
E ANTIINFLAMATÓRIA PARA CÃES

**Zelotril Oto**  
Enrofloxacin, sulfadiazina de  
prata e hidrocortisona

**Uso Veterinário**

#### **Fórmula:**

Cada 1 mL do produto contém:

Enrofloxacin.....	5 mg
Sulfadiazina de prata.....	10 mg
Acetato de hidrocortisona.....	2 mg
Succinato sódico de hidrocortisona.....	1,25 mg
Veículo.....q.s.p.....	1 mL

#### **Informações técnicas:**

**Zelotril Oto** é um antibacteriano, antifúngico e anti-inflamatório de uso tópico indicado para o tratamento da otite externa dos cães, complicada pela presença de bactérias e fungos suscetíveis à ação da enrofloxacin e da sulfadiazina de prata. A emulsão contém um anti-inflamatório de ação rápida (succinato sódico de hidrocortisona) e um de ação mais prolongada (acetato de hidrocortisona), que reduzem rapidamente os sinais cardeais da inflamação (rubor, edema, calor e dor), proporcionando alívio ao animal e favorecendo o processo de cura.

#### **Indicações:**

**Zelotril Oto** geralmente é efetivo no tratamento das otites externas dos cães causadas por um ou mais dos seguintes agentes etiológicos: *Malassezia pachydermatis*, *Staphylococcus spp. coagulase-positivo*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter spp.*, *Proteus mirabilis*, *Streptococcus spp.*, *Aeromonas hydrophila*, *Aspergillus spp.*, *Klebsiella pneumoniae* e *Candida albicans*.

#### **Posologia e modo de usar:**

O produto é exclusivamente de uso tópico para o tratamento das otites externas dos cães. Recomenda-se aplicar o produto conforme as orientações a seguir:

- 1) Remova o excesso de cerúmen, de crostas ou de exsudatos antes do início do tratamento;
- 2) Agite o frasco vigorosamente antes de administrar o produto;
- 3) Posicione a cabeça do cão com a orelha a ser tratada para cima;
- 4) Goteje o produto no interior do meato acústico do animal em quantidade suficiente para preenchê-lo e cobrir perfeitamente as lesões. Como regra geral, aplique 5 a 10 gotas por orelha em cães que pesam 16 kg ou menos e 10 a 15 gotas por orelha em cães que pesam mais que 16 kg.
- 5) Após a administração, massageie delicadamente a orelha do animal para distribuir o produto uniformemente. Aplique 2 vezes ao dia por até 14 dias ou a critério do Médico Veterinário. Mantenha o tratamento por 3 dias após a completa remissão dos sinais da doença. Siga todas as práticas de administração de agentes antimicrobianos.

#### **Contraindicações:**

- O produto é contraindicado em animais com histórico de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
- O produto não deve ser utilizado em cães com ruptura de membrana timpânica.

Assim, a integridade da membrana precisa ser clinicamente avaliada antes do uso deste medicamento. Caso ocorram alterações auditivas ou vestibulares no animal, o tratamento deverá ser interrompido.

**Precauções:**

- Uma pequena parte da população de cães (menos de 2%) pode exibir reações de sensibilidade ao produto, caracterizadas por inflamação aguda ou crônica do meato acústico e do pavilhão auricular. Nesse caso, recomenda-se a suspensão do tratamento.
- O produto deve ser evitado em animais com doenças do sistema nervoso central. Nesses casos, as quinolonas podem, raramente, provocar estimulação nervosa, gerando convulsões.
- Drogas da classe das quinolonas podem estar associadas a erosões nas cartilagens que sustentam um peso elevado ou a outras artropatias dos animais jovens de várias espécies.
- A segurança do produto não foi avaliada em fêmeas reprodutoras, em gestação ou amamentando filhotes.
- Guarde sempre o produto na posição correta com a tampa para cima. Não reutilize as embalagens vazias.

**Informações de segurança para o homem:**

**ATENÇÃO - Zelotril Oto** não é recomendado para uso humano. Evite o contato com os olhos e, em caso acidental, lave-os abundantemente com água durante 15 minutos. Se houver contato com a pele, evite a exposição à luz solar e lave com água e sabão.

**INFORMAÇÃO PARA O MÉDICO** - Antibacteriano, antimicótico e antiinflamatório veterinário de uso tópico à base de enrofloxacin, sulfadiazina de prata, acetato de hidrocortisona e succinato sódico de hidrocortisona.

**Apresentação:**

Frascos com 30 mL.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB  
ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 8.903 em 08/07/2004.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF nº 32.871



Proprietário e Fabricante:

**União Química Farmacêutica Nacional S/A.**

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90 - Embu-Guaçu - SP

CEP: 06900-000 - DDC: 0800 701 1799

CNPJ: 06.665.981/0001-18

® Marca Registrada - Indústria Brasileira