

# PRIMER<sup>®</sup>

## Monodose

### USO VETERINÁRIO

**ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA  
BOVINOS**

**O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.  
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

#### Descrição:

Primer<sup>®</sup> Monodose é um dispositivo intravaginal contendo progesterona, utilizado para a regulação do ciclo estral em bovinos, programas de inseminação artificial em tempo fixo (IATF), programas de superovulação de doadoras e sincronização de receptoras (TETF).

#### Fórmula:

Progesterona ..... 0,5 g  
Excipiente ...q.s.p..... 11,24 g

#### Apresentação:

Bolsas contendo 10 dispositivos.

#### Ação:

A progesterona liberada pelo dispositivo atinge níveis supraluteais (superiores a 0,8 ng/mL) poucas horas após sua colocação, exercendo um importante efeito sobre a dinâmica folicular e sobre o ciclo estral. Em associação com estrógenos a progesterona provoca regressão de folículo dominante e início de uma nova onda folicular. Após a retirada do dispositivo e a consequente queda dos níveis de progesterona, o bloqueio do eixo hipotálamo-hipofisário é liberado, permitindo o desenvolvimento final do folículo e a ovulação. Vários protocolos, associando a progesterona a outros hormônios, foram desenvolvidos com diversas finalidades, tais como: sincronização deaios e ovulações para inseminação em tempo fixo, sincronização de doadoras e receptoras.

#### Indicações:

Controle do ciclo estral em vacas e novilhas.

#### Modo de uso:

Com o uso do aplicador específico, inserir o dispositivo na vagina do animal, deixando a cauda plástica do produto para fora do vestíbulo vulvar, para sua posterior remoção.

#### Precauções:

Para a colocação no animal o operador deverá guardar as boas normas de higiene, conservando a limpeza do material e do animal.

Manipular o produto com uso de luvas.

Armazenar em local seco, fresco, ao abrigo da luz solar direta, manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

#### Período de carência:

Não há restrição para o consumo humano de leite e de carne de animais tratados com Primer<sup>®</sup> Monodose.

#### Efeitos colaterais:

Não há efeitos colaterais associados à progesterona. Ocasionalmente, pode-se perceber sinais de vaginite leve que desaparece espontaneamente após a retirada do produto, não comprometendo a eficácia do tratamento, nem a saúde do animal.

#### VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.056 em 23/04/2015.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871

#### Proprietário:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 - Embu-Guaçu - SP

CEP 06900-000 - DDG: 0800 701 1799

CNPJ: 60.665.981/0001-18

® Marca Registrada - Indústria Brasileira

#### Fabricante:

Laboratório Grascon do Brasil Ltda.

Rua Emílio de Souza Docca nº 472

Vila Santa Catarina - São Paulo - SP

CNPJ: 03.670.008/0001-53



4013371