

BIOCAN M
Vacina Inativada contra Dermatofitose causada por
***Microsporum canis* para cães e gatos**
Uso Veterinário

COMPOSIÇÃO:

Cada 1 mL contem:

Cepa imunogênica inativada de *Microsporum canis*

Título mínimo vacinal 500.000 UFC

Hidróxido de Alumínio 2% 0,15 mL

INDICAÇÕES:

Indicado para prevenção e tratamento de micoses dérmicas em cães e gatos, causadas pelo dermatófito *Microsporum canis*.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

A dose de “**BIOCAN M**” que deve ser aplicada é de 1 mL independente do peso, tamanho ou raça do animal.

CÃES:

Recomenda-se aplicar “**BIOCAN M**” apenas por via intramuscular (IM).

GATOS:

“**BIOCAN M**” pode ser aplicada pelas vias subcutânea ou intramuscular (SC ou IM).

No esquema de vacinação, tanto preventivo como terapêutico, os animais vacinados pela primeira vez devem receber uma dose de reforço com um intervalo entre 14 e 21 dias. No caso de vacinação com finalidade terapêutica, a terceira dose da vacina deve ser aplicada, se necessário, 18 a 24 dias após a revacinação e repetida anualmente a critério do Médico Veterinário.

Agite bem o frasco contendo a vacina e aspire o seu conteúdo com o auxílio de uma agulha e seringa estéreis e injetar rapidamente no animal.

PRECAUÇÕES DE USO:

- Limpar a tampa do frasco-ampola antes de aspirar cada dose. Usar seringa e agulha estéreis e secas.
- Conservar a temperatura adequada até o momento do uso.
- Não utilizar vacinas que tenham a data de validade vencida.
- As reações locais médias (inchaço médio ou pequenas crostas) podem ser notadas na área da aplicação intramuscular (IM) da vacina, porém estas desaparecem em poucos dias. Alterações semelhantes foram observadas nos gatos vacinados por via subcutânea (SC).

- Nenhum produto oral ou parenteral com efeitos antimicóticos deve ser usado ou qualquer outra intervenção imunoprolifática deve ser feita durante o período de 1 semana antes da primeira vacinação e de 2 semanas após a segunda vacinação de forma a não afetar o avanço da imunidade completa após a vacinação.
- Não vacinar fêmeas prenhes.
- Por ser um produto biológico, apesar de rara, pode ocorrer reação anafilática; sendo recomendável aplicar produtos anti-histamínicos, simpatomiméticos ou glucocorticoides junto com produtos anti-histamínicos. Após esta intervenção clássica, é recomendada a aplicação de cálcio.
- Profissionais que aplicam a vacina não precisam tomar cuidados especiais.

Conservar em geladeira entre 2°C e 8°C, ao abrigo da luz solar. Não congelar.

Mantenha este ou qualquer outro medicamento fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob no 9.217 em 08/06/06.

PRODUTO IMPORTADO

APRESENTAÇÃO:

Cartuchos plastificados contendo 01,02,05,10 e 20 doses.
Frasco-ampola com 1 mL.

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

ARSA S.R.L.
Buenos Aires - Argentina
Responsável Técnico: Dr. Jorge Sabbione

REPRESENTANTE EXCLUSIVO NO BRASIL, IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

União Química Farmacêutica Nacional S/A
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90, Embu-Guaçu - SP
CEP: 06900-000 CNPJ: 60.665.981/0001-18, DDG: 0800 701 1799
Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP nº 32.871