

4013922 - 100 x 140 mm

Proprietário:
União Química Farmacêutica Nacional S/A.
R. Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90
CEP: 06900-000 Embu-Guaçu - SP
DDG: 0800 701 1799 - CNPJ: 60.665.981/0001-18
© Marca Registrada - Indústria Brasileira

Fabricante:
Ipanema Ind. de Prod. Veterinários Ltda.
End.: Rod. Raposo Tavares, KM 113
Barroero/Aracajuá da Serra - SP - CEP: 18190-000
CNPJ: 64.687.015/0001-52 - INSCR. EST.: 178.005.260.113



Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Cipermetrina..... 5,0 g
Veículo.....q.s.p..... 100,0 mL

Indicações: BOVINOS

Carrapaticida: Combate o *Boophilus microplus*.
Mosquicida: Combate a *Haematobia irritans* (mosca do chifres);
combate a mosca doméstica e a *Stomoxys calcitrans* (mosca dos
estábulo). Repelente.

Modo de Usar:

Uso tópico (POUR ON); Produto pronto para uso. Aplicar sobre o
dorso lomboar do animal.

Dosagem:

Dose terapêutica: 10 mL de produto para cada 100 kg de peso
corpóreo sendo: 5 mg de Cipermetrina para cada kg de peso
corpóreo.

TABELA DE DOSES

Peso corpóreo (kg)	Dose (mL)
100	10
200	20
300	30
400	40
500	50

A dose máxima mesmo para animais com peso acima de 500 kg é
de 50 mL.

Duração do tratamento:

Geralmente uma única aplicação é suficiente.
Nos casos de alta infestação e a critério do Médico Veterinário, o
produto poderá ser reaplicado.

Obs: O produto não deixa resíduos na carne e no leite dos animais
tratados.

Limitações de uso:

Não tratar animais doentes ou convalescentes.



Precauções:

Usar luvas para a manipulação e aplicação do produto.

Não aplicar o produto sob sol intenso, nem em dias chuvosos.

Evitar o contato com os olhos, a pele e as mucosas.

Não reaproveitar as embalagens vazias.

Descartar de forma segura, evitando contaminar o meio ambiente.

Não comer, beber ou fumar, durante a manipulação do produto.

Após a aplicação, o operador deve lavar as mãos com água em
abundância e sabão.

Não armazenar o produto junto a alimentos, bebidas ou produtos de
higiene e domésticos.

Produto tóxico para peixes, pássaros e abelhas.

**MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS
DOMÉSTICOS.**

Tratamento de contaminação acidental:

Remover imediatamente as roupas contaminadas e lavar as partes
atingidas do corpo com água e sabão.

Se o produto atingir os olhos, lave-os imediatamente com água
durante 15 minutos e chame um médico.

Como não há antídoto específico, o tratamento deverá ser
sintomático.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO
MÉDICO VETERINÁRIO.**

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15 a 30°C), ao
abrigo da luz solar direta.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.465 em 03/08/98

A FISPQ deste produto poderá ser obtida junto ao DDG.

Apresentação:

Frasco plástico com dosador contendo 2 L.