

ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL DE USO ORAL PARA CÃES

**Fórmula:**

Cada comprimido de **Flamavet 0,5 mg** contém:

Meloxicam ..... 0,5 mg  
Excipientes (\*) .....q.s.p..... 60 mg

**\*contém palatilizante**

Cada comprimido de **Flamavet 2 mg** contém:

Meloxicam ..... 2 mg  
Excipientes (\*) .....q.s.p..... 240 mg

**\*contém palatilizante**

**Informações técnicas:**

**Meloxicam** é classificado como um anti-inflamatório não esteroideal (AINE), que possui atividade analgésica e antipirética. Pertence à classe do ácido enólico, um dos derivados de Oxicam. Esta classe de fármacos inibe a atividade da enzima ciclo-oxigenase (COX), da fosfolipase A2 e da síntese de prostaglandinas. Os AINEs podem ter sua maior ou menor segurança, de acordo com o grau de seletividade perante as ciclo-oxigenase (COX), enzimas que participam da síntese de prostaglandinas. As COX podem ser classificadas de maneira simplificada como COX-1, que é expressa constitutivamente na maioria dos tecidos e está associada a eventos fisiológicos como a integridade da mucosa gástrica, fluxo sanguíneo renal e na coagulação sanguínea, e COX-2, que é uma enzima de ação induzida relacionada aos eventos da resposta inflamatória. Como o meloxicam apresenta atividade seletiva para COX-2, isto confere uma segurança maior em relação aos efeitos adversos.

**Indicações:**

**Flamavet** é indicado como anti-inflamatório e analgésico para cães.

**Posologia e modo de usar:**

O produto deve ser administrado exclusivamente pela via oral.

Administrar o comprimido uma vez ao dia, em dosagem de acordo com a tabela abaixo:

Dosagem	Primeiro dia de tratamento	2º dia e tratamentos subsequentes
<b>Flamavet 0,5 mg</b>	2 comprimidos para cada 5 kg de peso corporal (0,2mg de meloxicam / kg de peso corporal)	1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal (0,1mg de meloxicam / kg de peso corporal)
<b>Flamavet 2 mg</b>	1 comprimido para cada 10 kg de peso corporal (0,2mg de meloxicam / kg de peso corporal)	½ comprimido para cada 10 kg de peso corporal (0,1mg de meloxicam / kg de peso corporal)

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro. De acordo com os estudos de segurança realizados, para tratamento em cães adultos pode ser indicada terapia prolongada por até 35 dias consecutivos e em cães filhotes (a partir de 4 meses) pode ser indicada terapia por até 7 dias consecutivos, ou a critério do Médico Veterinário.

**Contraindicações:**

O produto não deve ser administrado em animais com antecedentes de hipersensibilidade ao meloxicam ou qualquer um dos componentes da fórmula.

Não administrar o produto aos animais com histórico de ulceração gastrointestinal ativa.

Deve ser utilizado com cautela em pacientes hepatopatas, cardiopatas, doentes renais e com distúrbios hematológicos.

**Interações medicamentosas:**

Não administrar o **Flamavet** junto com outros anti-inflamatórios esteroidais ou não esteroidais e anticoagulantes devido ao maior risco de toxicidade gastrointestinal e sangramentos. Não utilizar com as medicações: digoxina,





fluconazol, metotrexato e drogas nefrotóxicas como furosemida, antibióticos aminoglicosídeos, entre outros. Alguns AINES podem reduzir o efeito dos inibidores da ECA sobre a pressão arterial e aumentar o risco de nefrotoxicidade.

#### **Efeitos adversos:**

Os efeitos adversos mais comumente relatados são náuseas, perda de apetite, apatia, diarreia, melena e ulceração gástrica. Elevação de enzimas hepáticas, prurido, azotemia, aumento da creatinina e falência renal também já foram descritos.

#### **Intoxicação e Superdosagem:**

No caso de intoxicação e superdosagem, realizar o tratamento suporte e sintomático, a critério do médico veterinário.

#### **Precauções:**

Produtos de uso veterinário devem ser mantidos fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas ou produtos de higiene pessoal.

Até o momento, não foram realizados estudos em animais abaixo de 4 meses, fêmeas prenhes ou lactantes.

*A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porém foram conduzidos estudos pela empresa fabricante que demonstraram que o produto apresenta as características desejadas e necessárias de eficácia e segurança para a indicação a que se destina obtendo, dessa forma, emissão de Licença Provisória.*

#### **Apresentação:**

Blister com 10 comprimidos, nas apresentações de 0,5 mg e 2,0 mg.

Display contendo 5 blísteres com 10 comprimidos de 0,5 mg e 2,0 mg.

Conservar em local seco, a temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento, sob o número 18/2017,  
em 12/06/2017.

Responsável Técnico:  
Vânia N. A. de Carvalho  
CRF-SP nº 32.871



Proprietário e Fabricante:  
**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**  
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90  
Embu-Guaçu – São Paulo – CEP: 06900-000  
DDG: 0800 701 1799 – CNPJ: 60.665.981/0001-18  
Indústria Brasileira

