AGENER UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

Animax Duo

ABAMECTINA 2% INJETÁVEL
USO VETERINÁRIO

ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE – ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Abamectina.....2,0 g
Veículo.....q.s.p.....100,0 mL

Indicações:
Animax DUO é um endectocida injetável de amplo espectro para bovinos, usualmente ativo contra os seguintes parasitos:
Nematódeos gastrintestinais: *Ostertagia ostertagi* (incluindo larvas inibidas), *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia oncophora* (incluindo larvas hipobióticas de 4° estágio), *Cooperia punctata* (incluindo larvas hipobióticas de 4° estágio), *Cooperia pectinata*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger* (adultos), *Strongyloides papillosus* (adultos), *Bunostomun phlebotomun*, *Oesophagostomun radiatum*, *Chabertia ovina* (adultos), *Trichuris spp.* (adultos).
Parasitas pulmonares: *Dictyocaulus viviparus* (adultos e de 4° estágio)
Vermes oculares: *Thelazia spp.* (adultos)
Bernes (estágios parasitários): *Dermatobia hominis*
Miíase cutânea (estados parasitários): *Cochliomyia hominivorax*
Piolhos sugadores: *Haematopinus eurysternus*, *Linognathus vituli*, *Solenoptes capillatus*
Ácaros: *Sarcoptes scabiei var. bovis*, *Psoroptes communis var. bovis*
Carrapatos: *Boophilus microplus* (eficácia máxima atingida a partir de 4 a 5 dias após o tratamento).
O produto previne o desenvolvimento de bicheiras que ocorrem na ferida da castração quando é aplicado imediatamente após a cirurgia. Recomenda-se o monitoramento dos bovinos até a cicatrização. Se houver necessidade de tratamento curativo, recomenda-se a utilização de um mata-bicheira tópico específico.

Forma de Uso:
• Injetar o produto pela via subcutânea.
• Aplicar na pele solta, na parte anterior ou posterior da paleta. Utilizar agulhas de calibre 16, com 15 a 20 mm.
• Manter os cuidados de assepsia para produtos injetáveis utilizando somente material esterilizado ou descartável.

Tabela de dosificação:
A dose prescrita é de 200 mcg de abamectina por kg de peso em DOSE ÚNICA. A administração de uma nova dose deste produto deverá ser prescrita pelo Médico Veterinário responsável pelo acompanhamento do animal, segundo um programa pré-estabelecido de controle das verminoses. **Ajustar a quantidade de acordo com o peso de cada grupo de animais para evitar dose excessiva. Cada mL do produto é suficiente para tratar um animal de até 100 kg, conforme a tabela abaixo:**

Peso*	Quantidade de produto	Peso*	Quantidade de produto
80 kg	0,8 mL	360 kg	3,6 mL
100 kg	1,0 mL	380 kg	3,8 mL
120 kg	1,2 mL	400 kg	4,0 mL
140 kg	1,4 mL	420 kg	4,2 mL
160 kg	1,6 mL	440 kg	4,4 mL
180 kg	1,8 mL	460 kg	4,6 mL
200 kg	2,0 mL	480 kg	4,8 mL
220 kg	2,2 mL	500 kg	5,0 mL
240 kg	2,4 mL	520 kg	5,2 mL
260 kg	2,6 mL	540 kg	5,4 mL
280 kg	2,8 mL	560 kg	5,6 mL
300 kg	3,0 mL	580 kg	5,8 mL
320 kg	3,2 mL	600 kg	6,0 mL
340 kg	3,4 mL		

*Não aplicar em animais com menos de 4 meses, caquéticos, estressados, convalescentes, submetidos a esforços físicos extenuantes e nos horários mais quentes do dia.

Precauções:
• Recomenda-se o uso de instrumentos estéreis, assim como a limpeza completa do local de aplicação.
• Em alguns casos, pode-se observar desconforto passageiro após a aplicação. Pode ocorrer também leve edema ou inchaço no ponto da injeção. Tais reações são transitórias e geralmente não necessitam de tratamento.
• No uso indicado, o produto não provoca efeito adverso na capacidade reprodutiva do bovino.
• Usar luvas de borracha para aplicação, evitando contato com a pele.
• Manipular o produto com cuidado. Não beber, fumar ou comer durante sua administração. Lavar as mãos após a aplicação.

Contraindicações:
- O PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM ANIMAIS COM MENOS DE DEZESSEIS SEMANAS DE IDADE (4 MESES).
- NÃO APLICAR EM ANIMAIS CAQUÉTICOS.
- NÃO APLICAR EM ANIMAIS ESTRESSADOS.
- NÃO APLICAR EM ANIMAIS EM PERÍODO DE CONVALESCENÇA.
- NÃO APLICAR EM ANIMAIS SUBMETIDOS A ESFORÇOS FÍSICOS EXTENUANTES OU A LONGO PERÍODO DE TRANSPORTE.
- EVITAR A APLICAÇÃO EM PERÍODOS MUITO QUENTES DO DIA.
- SEGUIR SEMPRE AS RECOMENDAÇÕES DE DOSAGEM CONFORME O PESO DO ANIMAL. ATENÇÃO: PRODUTO A 2%.
- ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER APLICADO POR VIA INTRAVENOSA OU INTRAMUSCULAR.

Período de carência:
- Não abater bovinos para consumo humano até decorridos 28 dias do último tratamento.
- Não tratar fêmeas leiteiras lactantes.

Conservação:
Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Armazenamento:
• As embalagens vazias devem ser adequadamente destruídas (incinerar ou enterrar), evitando contaminar o meio ambiente. A abamectina livre pode afetar peixes e organismos aquáticos em geral.
• Armazenar os frascos em caixas de papelão para protegê-los da luz.

Apresentação:
Frascos-ampola contendo 500 mL e 1 L.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura
sob n° 8.867 em 10/05/2004

Responsável Técnico:
Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP nº 32.871

AGENER UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

Proprietário e Fabricante:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90
Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-000
DDG: 0800 701 1799
CNPJ: 60.665.981/0001-18
® Marca Registrada - Indústria Brasileira

4015229 - 90 x 150 mm - Laetus 321