



# Placentex

Ocitocina

Uso Veterinário

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA  
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS,  
SUÍNOS E EQUINOS TRATADOS.  
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS, OVINOS  
E CAPRINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR  
A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM  
ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

#### FÓRMULA:

Ocitocina sintética padronizada.....10 UI  
Veículo.....q.s.p.....1 mL

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

PLACENTEX é um produto à base de ocitocina sintética, que é uma substância dotada das  
mesmas propriedades químicas, farmacológicas e fisiológicas da ocitocina natural, produzida pelo  
lobo posterior da hipófise.

A ocitocina tem ação seletiva sobre a musculatura lisa do útero e dos alvéolos e canais  
galactóforos, estimulando e reforçando as suas contrações.

Conseqüentemente, facilita o trabalho de parto, a expulsão da placenta e a secreção do leite,  
promovendo um esvaziamento mais completo do úbere.

Pelo fato de não ter ação sobre o peristaltismo intestinal nem sobre o sistema circulatório, e por  
não ter ação cumulativa, a aplicação do produto poderá ser repetida sem qualquer risco à saúde do  
animal.

#### INDICAÇÕES E MODO DE USAR:

1. Retenção de placenta, atonia do útero e em casos tardios de retenção de placenta.
2. Em casos de retenção do leite, após o parto: injeção subcutânea. Após 5 a 10 minutos, iniciar  
lenta e progressivamente a ordenha.
3. Na insuficiência contrátil primária ou secundária da musculatura uterina durante o parto.
4. Como medicação auxiliar para encurtar o período de expulsão do feto e placenta por meio  
da injeção subcutânea.

#### POSOLOGIA:

Espécie	Dosagem	
	Subcutânea	Intravenosa
Éguas e vacas	2 - 4 mL	1,5 - 4 mL
Porcas até 250 kg	1 - 2 mL	1 mL
Porcas acima de 250 kg	3 mL	1 - 2 mL
Ovelhas e cabras	0,3 - 1,5 mL	0,2 - 1 mL





**Apresentação:** Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 50 mL e 100 mL.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO  
MÉDICO VETERINÁRIO.**

Período de validade: Em sua embalagem original fechada a validade do produto é de 36 meses após a fabricação.

Após aberto, o produto deve ser utilizado em até 15 dias.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho  
CRF-SP nº 32.871

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 1.736 em 10/08/1983.



Proprietário e Fabricante:  
**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**  
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90  
Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-000  
DDG: 0800 701 1799  
CNPJ: 60.665.981/0001-18  
® Marca Registrada - Indústria Brasileira



4017418 - 100 x 150 mm - Laetus 351