



# Decathrine

## SC 25

### Deltametrina

#### USO VETERINÁRIO

#### SUSPENSÃO CONCENTRADA PARA DESINSETIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES AGROPECUÁRIAS

#### Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Deltametrina.....	2,5 g
Veículo q.s.p.....	100,0 mL

#### INDICAÇÕES:

**DECATHRINE SC 25** é indicado para o combate aos seguintes parasitas em instalações agropecuárias: **pulgas** (*Ctenocephalides felis felis* – adultas), **carrapatos** (*Rhipicephalus microplus* – larvas, ninfas, adultos; *Amblyomma cajennense* – larvas, ninfas e adultos; *Rhipicephalus sanguineus* – larvas, ninfas e adultos), **moscas** (*Stomoxys calcitrans* – larvas e adultos, *Musca domestica* – fase adulta), **mosquitos** (*Aedes aegypti* – fase adulta; *Culex quinquefasciatus* – fase adulta), **baratas** (*Periplaneta americana* – fase adulta; *Blattella germânica* – fase adulta) e **formigas** (*Tapinoma melanocephalum* – adultos). O produto pode ser utilizado em instalações rurais tais como estábulos, pocilgas, depósitos aviários e esterqueiras.

#### MODO DE USAR:

O produto deverá ser aplicado nas instalações agropecuárias sob forma de pulverização, diluído na dosagem de 6 a 8 mL por litro de água conforme o parasita a ser controlado.

Recomenda-se fazer uma pré-mistura do produto com uma quantidade pequena de água, misturar vigorosamente e depois adicionar o restante do volume de água, até se obter uma calda perfeitamente homogênea.

O produto deve ser diluído somente no momento do uso, não se recomendando armazenar as diluições para uso futuro.

#### Diluição:

QUANTIDADE DE DECATHRINE SC 25		
Quantidade de água	Moscas e Mosquitos	Outros parasitas (carrapatos, pulgas, baratas e formigas)
1 L	6 mL	8 mL
10 L	60 mL	80 mL
20 L	120 mL	160 mL
30 L	180 mL	240 mL

Utilize 1 litro de calda para 20 m<sup>2</sup> de superfície. Borrife generosamente o produto nas instalações agropecuárias. Aplique por meio de pulverizador em superfícies passíveis de repouso, trânsito e esconderijo dos insetos. Deixe secar espontaneamente ao ar livre, garantindo que o produto não seja removido.

#### VIA E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO:

Produto de uso externo para aplicação em instalações agropecuárias.

#### NÃO ADMINISTRE ESTE PRODUTO POR OUTRA VIA QUE NÃO SEJA A INDICADA

#### CONTRAINDICAÇÃO E LIMITAÇÃO DE USO:

Não utilize próximo a alimentos, utensílios de cozinha e aquários.

#### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

**Decathrine SC 25** apresenta uma grande segurança para o usuário, porém, cuidados básicos são recomendados no uso de inseticidas:

- Manuseie o produto e faça as diluições em locais arejados. Não aplique o produto contra o vento para evitar o contato com as partículas pulverizadas.





- Use equipamentos de proteção individual na aplicação.
- Não permita que o produto entre em contato com suas vestes ou pele. Caso isto ocorra, remova as vestes contaminadas e lave a pele atingida pelo produto.
- Não fume, coma ou beba durante a aplicação.
- Não aplique o produto (puro ou diluído) sobre a água, alimentos ou rações.
- Aplique o produto exatamente de acordo com as instruções contidas no rótulo.
- As embalagens não devem ser mantidas em locais que possam contaminar o meio ambiente.
- Retire os animais das instalações durante a aplicação, e só permita a reentrada deles no mínimo após 12 horas a contar da aplicação do produto, e com ventilação do local.
- Não jogue o produto ou resto de diluições em açudes, fontes, rios, tanques de água ou na rede de esgoto de águas pluviais.

Informação para o médico: produto de uso veterinário à base de deltametrina.

- Se o produto atingir os olhos, lave-os imediatamente com água corrente abundante durante pelo menos 15 minutos. Evite a exposição à luz solar direta. Trate a irritação com anti-histamínicos.
- Caso tenha ocorrido ingestão acidental, não provoque vômitos e administre carvão ativado para evitar a absorção.
- Em caso de inalação acidental pela deltametrina, observe o paciente por um período de 48 horas.
- Tratamento em caso de convulsões: diazepam (por via intravenosa ou intra-retal) e atropina em caso de efeitos colinérgicos.
- Contraindicação: medicamentos estimulantes do sistema nervoso central.

#### CONSERVAÇÃO:

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30° C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

#### ARMAZENAMENTO:

- Mantenha a embalagem hermeticamente fechada, abrindo-a somente no momento do uso.
- Armazene em local específico para o produto, longe de medicamentos, alimentos, rações e produtos de higiene.

#### APRESENTAÇÃO:

Frasco contendo 30 mL acondicionado em cartucho.

A FISPQ deste produto poderá ser obtida junto ao DDG

### VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000292-5.000014 em 27/11/2003

Responsável Técnico:  
Vânia N. A. de Carvalho  
CRF-SP nº 32.871



Proprietário:

**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90  
Embu-Guaçu – São Paulo – CEP 06900-000  
DDG 0800 701 1799 – CNPJ 60.665.981/0001-18  
Indústria Brasileira

Fabricante:

**Ipanema Ind. de Prod. Veterinários Ltda.**  
Rod. Raposo Tavares, Km 113  
Bairro/ Araçoiaba da Serra –SP  
CEP:18190-000 – Insc. Est.: 178.005.260.113  
CNPJ: 64.687.015/0001-52  
Industria Brasileira

