

# **Gentamasti L**

## **Vaca Lactante**

**Uso Veterinário**  
**Aplicação Intramamária**

### **Fórmula:**

Cada 10 g contém:

Gentamicina (Sulfato).....250 mg\*

Prednisolona.....10 mg

Veículo q.s.p.....10 g

\*equivalente a 417 mg de sulfato de gentamicina.

### **Indicações:**

**GENTAMASTI L** é indicado no tratamento de mastites agudas e crônicas de vacas em lactação, causadas por agentes Gram-positivos e Gram-negativos sensíveis à gentamicina: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus spp.*

**Prednisolona** - possui ação anti-inflamatória.

### **Posologia e modo de usar:**

Após a ordenha, limpar e desinfetar bem a ponta e canal da teta. Injetar o conteúdo de 1 (uma) seringa em cada quarto afetado, fazer leves massagens de baixo para cima a fim de acelerar o processo de difusão da suspensão.

### **Dosagem:**

A dosagem recomendada é uma seringa de **GENTAMASTI L** por via intramamária por dia, em cada um dos quartos afetados.

### **Duração do Tratamento**

A duração do tratamento pode variar entre 3 e 5 dias, de acordo com a recomendação do médico veterinário.

### **“ATENÇÃO - OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA”**

#### **BOVINOS**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**Precauções:**

- Antes da aplicação intramamária do produto, esgotar o leite, limpar e desinfetar bem o bico da teta e o orifício do canal.
- Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Utilizar o produto somente para fins veterinários.
- Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar.
- Em casos de hipersensibilidade à gentamicina ou prednisolona, suspender o tratamento e avisar o médico veterinário.

**Venda sob prescrição do Médico Veterinário.**

**Apresentação:**

Seringa descartável contendo 10g.

**Data de vencimento:**

02 (dois) anos após a data de fabricação

Licença provisória no Ministério da Agricultura sob nº 072 em 07/02/2003, emitida conforme Artigo 3º, Parágrafo 4º do Decreto Lei 467/69.

**Responsável Técnico:** Dr. Paulo Ruegger - CRF-SP - 11.220

**Proprietário e Fabricante.**

**SWISSBRAS CHEMICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.**

Rua José Sierra nr, 211 - Eldorado Centro  
Empresarial e Industrial  
São José dos Campos-SP - CEP 12.238-571  
PABX: (12) 3966-3172 - CNPJ: 06.222.419/0001-74

**Distribuído por:**

UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A.  
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito nr. 90 - Embu - Guaçu  
SP - CEP 06900-000  
CNPJ 60.665.981/0001-18 - DDG 0800 701 1799

Cód. 047/4