

# Gentamasti S

## Vaca Seca

Uso Veterinário  
Aplicação Intramamária

### Fórmula:

Cada 10 g contém:

Gentamicina (Sulfato).....400 mg\*

Miconazol (nitrato).....200 mg

Veículo q.s.p.....10 g

\*equivalente a 677 mg de sulfato de gentamicina.

### Propriedades:

O tratamento rotineiro com **GENTAMASTI S** vaca seca durante o período em que não há lactação, elimina as infecções mamárias presentes, previne novas infecções durante este período e contribui para reduzir a incidência de mastite clínica durante o próximo período de lactação. A ação bacteriana da gentamicina atinge os principais agentes gram-positivos e gram-negativos causadores das mastites. Sua ação prolongada se estende por 4 semanas.

### Indicações:

**GENTAMASTI S** é efetivo contra microorganismos que provocam as infecções mamárias: *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Micrococcus spp.* Fungos: *Cândida albicans*, *Cândida tropicalis*, *Cândida glabrata*, *Cryptococcus neoformans*, *Histoplasma capsulatum* e *Coccidioides immitis*.

### Posologia e modo de usar:

Após a última ordenha da lactação, limpar e desinfetar bem as tetas. Injetar através da teta o conteúdo de 1 (uma) seringa em cada quarto. Fazer leves massagens de baixo para cima para facilitar a dispersão da suspensão.

### “ATENÇÃO - OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA”

#### **BOVINOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**Precauções:**

- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar.
- Utilizar o produto somente para fins veterinários.
- Não administrar em vacas leiteiras em lactação.
- Em casos de hipersensibilidade à gentamicina ou miconazol, suspender o tratamento e avisar o médico veterinário.

**Venda sob prescrição do Médico Veterinário.**

**Apresentação:**

Seringa descartável contendo 10g.

**Data de vencimento:**

02 (dois) anos após a data de fabricação

Licença provisória no Ministério da Agricultura sob nº 086 em 13/02/2003, emitida conforme Artigo 3º, Parágrafo 4º do Decreto Lei 467/69.

**Responsável Técnico:** Dr. Paulo Ruegger - CRF-SP - 11.220

**Proprietário e Fabricante.**

**SWISSBRAS CHEMICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.**

Rua José Sierra, 211- Eldorado Centro Empresarial e Industrial

São José dos Campos-SP - CEP 12.238-571

PABX: (12) 3966-3172 - CNPJ: 06.222.419/0001-74

**Distribuído por:**

UNIÃO QUÍMICA FARMACEÚTICA NACIONAL S/A.

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito nr. 90 - Embu - Guaçu

SP - CEP 06900-000

CNPJ 60.665.981/0001-18 - DDG 0800 701 1799

Cód. 048/3