

717981771130639

Composição: Cada dose de vacina contém (antes da inativação de cada agente): IBR (HVBI $\geq 10^{7,20}$ DICT 50%/dose) e (HVBS $\geq 10^7$ DICT 50%/dose), vírus de DVB ($\geq 10^{6,20}$ DICT 50%/dose), *Leptospira interrogans* serovares Pomona ($\geq 1 \times 10^7$ Bact/dose), Icterohaemorrhagiae ($\geq 1 \times 10^7$ Bact/dose), Canicola ($\geq 1 \times 10^7$ Bact/dose), Hardjo ($\geq 1 \times 10^7$ Bact/dose), Wolffii ($\geq 1 \times 10^7$ Bact/dose), *Leptospira borgpetersenii* serovar Tarassovi ($\geq 1 \times 10^7$ Bact/dose), *Leptospira kirschneri* serovar Grippotyphosa ($\geq 1 \times 10^7$ Bact/dose), *Campylobacter foetus foetus* ($\geq 10^8$ UFC/dose), *Campylobacter foetus venerealis* ($\geq 10^8$ UFC/dose) e *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*) ($\geq 10^8$ UFC/dose), com adjuvante Pilatus GHA500[®], Hidróxido de Alumínio de Alta Adsorção Protéica, solução fisiológica tamponada q.s.p. 5 mL. **Indicação:** Vacina para prevenção das enfermidades reprodutivas dos bovinos, produzida pela ação individual ou combinada dos seguintes agentes: Rinotraqueíte Infeciosa Bovina HVBI e HVBS, Diarréia Viral Bovina, *Leptospirose* serovares Pomona, Icterohaemorrhagiae, Canicola, Hardjo, Tarassovi, Grippotyphosa, Wolffii, *Campylobacteriose* e por *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*). **Dosagem e via de aplicação:** Aplicar 5 mL por via subcutânea. **Cronograma vacinal para orientação:** Bezerros: aplicar duas doses com 60 e 30 dias antes do desmame. Vacas, novilhas e touros: (sem histórico anterior de vacinação e soronegativos); vacinar o quanto antes e revacinar 30 dias após a primeira dose. Vacas, novilhas e touros (com histórico anterior de vacinação): revacinar 30 dias antes do serviço/monta. Em fêmeas prenhas, recomenda-se vacinar duas doses com um intervalo de 20 a 30 dias, durante 6^o e 7^o mês de gestação. Revacinar anualmente com dose única 30 dias antes do serviço. O esquema sugerido pode ser alterado de acordo com a recomendação de um médico veterinário. Caso necessário e sob orientação de um Médico Veterinário: vacinar todas as categorias em período reprodutivo, a cada 6 meses. **Precauções e Advertências:** Manter fora do alcance das crianças e animais domésticos. EVITAR A AUTO-INOCULAÇÃO. A auto-inoculação poderá provocar reação inflamatória local, sem perigo à saúde. No caso de contato acidental com o produto, entre em contato imediatamente com um médico. Não vacinar animais enfermos, subnutridos, parasitados ou sob condições de estresse. Agitar bem o frasco antes de usar. Desinfetar o local da aplicação e usar seringas e agulhas estéreis. A vacina pode gerar uma reação no local da aplicação que desaparece progressivamente. Em caso de reação anafilática, administrar epinefrina 1% ou equivalente. Verificar o prazo de validade do produto. Uso concomitante com substâncias antibióticas e/o anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação. **Conservação:** Conservar entre 2°C a 8°C, devendo ser protegido da luz solar, calor e congelamento. Uma vez aberta, a vacina deverá ser utilizada dentro de 24 horas.

Proprietário e fabricante: Tecnovax S.A. - Luis Viale 2835 (C1416DNU) Cidade de Buenos Aires, Argentina. ■ SENASA: Cert. Nº 09-102. Estab. Heb. Nº 8520.
Representante exclusivo no Brasil, Importador e distribuidor: Tecnovax do Brasil Importação e Comércio de Produtos Veterinários Ltda. - Rua das Castanheiras 200, G 55/56 - Hortolândia - SP - CNPJ: 14.711.769/0002-03. Responsável Técnico: Dra Bibiana Carneiro CRMV-SP: 9782. Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 10.170/2015. Vencimento: 12 meses após a data de fabricação.

PACON 0317-2

PART:

FAB.:

VENC.:

Providean[®]

REPRO 12

Vacina Inativada contra a Síndrome Reprodutiva Bovina

IBR • DVB • *Leptospira interrogans* serovars Pomona, Icterohaemorrhagiae, Canicola, Hardjo, Wolffii, *Leptospira borgpetersenii* serovar Tarassovi, *Leptospira kirschneri* serovar Grippotyphosa • *Campylobacter foetus foetus* • *Campylobacter foetus venerealis* • *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*.)

250 mL • 50 DOSES


Providean[®] REPRO 12

PRODUTO IMPORTADO



USO VETERINÁRIO