

FÓRMULA:

Cada 100 g contém:

Clorfenirafina.....	2,5 g
Cipermetrina.....	0,15 g
Alúmen.....	2,0 g
Violeta de Genciana.....	1,0 g
Excipiente.....q.s.p.....	100 g

INDICAÇÕES:

Tratamento de ferimentos de origem traumática ou cirúrgica (como descorna, castração, caudectomia, marcações, etc), do umbigo dos recém-nascidos e de pododermatites (frieiras e rachadura de cascos). Também indicado para o tratamento e prevenção das infestações por larvas de insetos (bernes e bicheiras) e ectoparasitas adultos, como carrapatos e moscas. Apresenta ação adstringente e antisséptica, favorecendo e acelerando o processo de cicatrização dos ferimentos tratados. Este produto é destinado para o tratamento de bovinos, ovinos, caprinos, equinos e suínos. É especialmente indicado para o controle de ectoparasitas no pavilhão auricular (orelhas) dos equinos.

VIA E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO:

Produto exclusivamente de uso externo, para ser aplicado sobre lesões na pele do animal.

MODO DE USAR:

1. Limpe o máximo possível o ferimento com um produto destinado para assepsia.
2. Use luvas impermeáveis para aplicar e evite aspirar o produto.
3. Aplique generosamente o produto sobre o local do ferimento ou outro tipo de lesão.
4. Garanta que o produto cubra totalmente a área lesada, penetrando o máximo possível no ferimento.
5. Garanta que o produto não seja removido.

DOSES:

Normalmente, este produto é administrado em uma dose diária, quando é feito o curativo da lesão. A frequência de uso, entretanto, deve ser estabelecida pelo médico veterinário.

Este produto deverá ser usado até que o ferimento cicatrize completamente.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÃO DE USO:

Este produto deve ser aplicado numa área menor que um quarto da superfície corpórea do animal.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES NO USO:

Siga todas as boas práticas de administração de produtos contendo inseticidas.

NÃO REUTILIZAR AS EMBALAGENS VAZIAS.



Boiflin Pó

USO VETERINÁRIO

Mata-bicheira
Repelente
Antisséptico
Cicatrizante

Conteúdo: 2 kg

AGENER
UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

ATENÇÃO – NO CASO DE INTOXICAÇÃO, IRRITAÇÃO, ASPIRAÇÃO OU INGESTÃO ACIDENTAL: Procure auxílio médico imediatamente e leve a embalagem. Aplicar atropina em caso de efeitos colinérgicos.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar em local específico para o produto, isolado de medicamentos, alimentos, rações e produtos de higiene.

CONSERVAR EM LOCAL SECO, À TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30 °C), AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA E FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

APRESENTAÇÃO: Frasco dosador contendo 100 e 200 g do produto ou balde plástico contendo 1 e 2 kg do produto, acondicionado em saco plástico.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

CUIDADO - PRODUTO TÓXICO

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 8.666 em 29/08/2003.

Responsável Técnico:

Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871

Proprietário:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, nº 90

Embu-Guaçu - SP

CEP: 06900-000 - DDG: 0800 701 1799

CNPJ: 60.665.981/0001-18

© Marca Registrada

Indústria Brasileira

Fabricante:

Ipanema Ind. de Prod. Veterinários Ltda.

Rod. Raposo Tavares, Km 113

Barreiro/Araçoiaba da Serra - SP

CEP: 18190-000

Inscr. Est.: 178.005.260.113

CNPJ: 64.687.015/0001-52



7 896006 210207



4007536