

*DIURÉTICO INJETÁVEL PARA GRANDES ANIMAIS*

**Fórmula:**

Cada 100 mL contém:

Furosemida.....	5,0 g
Veículo q.s.p.....	100,0 mL

**Indicações:**

Diurético salurético indicado para tratamento de edemas tissulares de diversas origens de grandes animais.

- Tratamento de edemas associados às insuficiências cardíacas (congestão pulmonar, ascite etc.) e hepáticas.
- Hemorragia pulmonar após exercícios em equinos.
- Picada de cobra.
- Edema de gestação e edema fisiológico da glândula mamária pós-parto. Recomenda-se sua aplicação especialmente nos últimos 3 meses da gestação a fim de diminuir os líquidos em excesso acumulados no organismo.
- Indicado ainda para situações onde seja necessária uma diurese forçada como oligúria (nos casos brandos de falha renal), tratamento de intoxicações e procedimentos diagnósticos.

**Via e forma de administração:**

Produto de aplicação parenteral exclusivamente por injeção intramuscular ou intravenosa.

A furosemida é um potente diurético salurético. Recomenda-se que no início do tratamento o animal seja mantido em observação com especial atenção ao acompanhamento do seu estado de hidratação e equilíbrio de eletrólitos. Se necessário, a dose deverá ser ajustada às necessidades do animal.

**Posologia**

**• Bovinos e equinos:**

Recomenda-se de 0,5 a 1 mg/kg de peso vivo ou 5 a 10 mL/animal (250 a 500 mg), a cada 12 ou 24 horas, até a completa recuperação.

**• Ovinos, caprinos e suínos:**

A dose recomendada é de 0,5 a 1 mg/kg de peso vivo ou 2,5 a 5,0 mL/animal (125 a 250 mg), a cada 12 ou 24 horas, até a completa recuperação.

**Contraindicação e Limitação de uso:**

Este medicamento é contra-indicado para os seguintes casos:

- Anúria e insuficiência renal grave.
- Insuficiência hepática grave.
- Quadros de desidratação e desequilíbrio de eletrólitos.
- Animais hipersensíveis ou alérgicos à furosemida.

**Cuidados e Precauções no uso:**

Siga todas as boas práticas de administração de produtos injetáveis.

Este produto apresenta uma formulação alcalina. Portanto, não deve ser misturado a soluções contendo glicose ou outros medicamentos injetáveis com formulação ácida.



**ATENÇÃO - NO CASO DE INTOXICAÇÃO:** Procure auxílio médico imediatamente. Informação para o médico: diurético veterinário injetável à base de furosemida.

**Intoxicação e Superdosagem:**

Os principais sinais da ingestão acidental manifestam-se por meio de um quadro de desidratação e desequilíbrio de eletrólitos, acompanhado de uma diurese paradoxal. O tratamento fundamenta-se na reposição de água e sais.

**Interações medicamentosas:**

- A hipocalcemia induzida pela furosemida pode aumentar o potencial tóxico da digoxina.
- Com o uso contínuo, pode haver perdas de vitaminas hidrossolúveis, como as do complexo B.

**Conservação:**

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15 a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**Apresentação:**

Flaconetes contendo 2 mL e frascos-ampola contendo 5 mL.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO  
SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho CRF-SP nº 32.871

Licenciado no Ministério da Agricultura  
sob nº 8.427 em 16/12/2002.



Proprietário e Fabricante:

**União Química Farmacêutica Nacional S/A.**

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90

Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-000

DDG: 0800 701 1799 - CNPJ: 60.665.981/0001-18

® Marca Registrada - Indústria Brasileira

