

ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

EQUÍDEOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 21 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Ivermectina.....	0,40 g
Pamoato de Pirantel.....	38,30 g
Excipienteq.s.p	100,00 g

Indicações:

Indicado para o controle e tratamento das verminoses gastrintestinais que parasitam os equinos, asininos e muares.

Mectimax Plus Pasta usualmente é ativo contra os seguintes helmintos:

- Grandes Estrongilídeos: Adultos e estágios arteriais de *Strongylus vulgaris*, adultos e estágios tissulares de *S. edentatus*, adultos de *S. equinus* e *Triodontophorus* spp.
- Pequenos Estrongilídeos: Adultos e larvas de 4º estágio de *Cyathostomum* spp, *Cylicocycclus* spp, *Cylicostephanus* spp, *Cylicodontophorus* spp e *Cyalocephalus* spp.
- Outros vermes redondos: Formas adultas de *Habronema muscae*, *Trichostrongylus axei* e *Strongyloides westeri*. Adultos e imaturos de *Oxyuris equi*. Adultos, formas migratórias (L3) e imaturos (L4) de *Parascaris equorum* e microfilárias de *Onchocerca* spp.
- Vermes Pulmonares: Adultos e larvas de 4º estágio de *Dictyocaulus arnfieldi*.
- Gasterófilos: Estágios gástricos e orais de *Gasterophilus* spp.
- Dermatoses causadas por larvas cutâneas de *Habronema* e *Draschia* spp (feridas de verão ou esponjas).
- Cestódeos (Tênia): *Anaplocephala perfoliata*, *Anaplocephala magna*, *Paranoplocephala mamillana*.

Forma de Uso:

- Observe a graduação existente no êmbolo da seringa.
- Girar o anel, ajustando-o no êmbolo de acordo com o peso do animal a ser tratado.
- Introduzir a extremidade da seringa na boca do animal, pressionar o êmbolo até o anel, depositando a pasta sobre a língua, sempre em direção ao fundo da boca.

Tabela de Dosificação:

A dose prescrita é de 200 mcg de IVERMECTINA por kg de peso e de 6,6 mg de Pirantel base por kg de peso em DOSE ÚNICA.

Peso	Quantidade de Produto
Até 100 kg	5,0 g
Até 200 kg	10,0 g
Até 300 kg	15,0 g
Até 400 kg	20,0 g
Até 500 kg	25,0 g

Observação: Em infecções agudas por Cestódeos, recomendamos duplicar a dose, sabendo que a Ivermectina não apresenta nenhuma toxicidade na dose de 400 mcg/kg de peso.

Período de Carência:

Aos equídeos que se destinarem ao consumo humano, suspender o tratamento 21 dias antes do abate.

Precauções:

- Não dar água de beber ao animal imediatamente após a administração do produto.
- Manipular o produto com cuidado; não beber, não fumar ou comer durante sua administração.
- As embalagens vazias devem ser adequadamente destruídas, evitando contaminar o meio ambiente.

Contraindicações:

O produto pode ser administrado em equídeos de todas as idades, bem como em potros lactentes, fêmeas prenhes ou garanhões em cobertura, dispensando dieta alimentar antes ou depois do tratamento.

Interações Medicamentosas:

Mectimax Plus Pasta não deve ser administrado simultaneamente com outros fármacos com mesmo mecanismo de ação, como por exemplo, inseticidas neuro-bloqueadores, devido ao risco de uma exacerbação do efeito no animal hospedeiro. Igualmente, o pirantel não deve ser administrado com vermífugos a base de piperazina, por apresentar ação

Apresentação:

Seringa plástica descartável, com êmbolo graduado, contendo 25 g do produto.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.428 em 16/12/2002.



Proprietário e Fabricante:

União Química Farmacêutica Nacional S/A.

R. Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90

Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-000

DDG: 0800 701 1799 - CNPJ: 60.665.981/0001-18

® Marca Registrada - Indústria Brasileira

