



Agecox^{Neo}

Toltrazuril 5%

Uso Veterinário

**ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
SUÍNOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE
PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 65 DIAS APÓS A
APLICAÇÃO DO PRODUTO.**

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

ANTICOCCIDIANO PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DIARREIA EM SUÍNOS

Fórmula:

Cada 1 mL contém:

Toltrazuril.....	50 mg
Veículo.....	q.s.p..... 1 mL

Informações técnicas:

A coccidiose, também conhecida como isosporose, é causada pelo protozoário *Isospora suis*. Os enterócitos (células do intestino) são parasitados pelo protozoário, principalmente na região do jejuno e íleo, causando diarreias. Os leitões de 5 a 20 dias de idade são os que apresentam sinais clínicos da doença.

O **Agecox Neo** é o coccidicida mais utilizado em suínos, sua função é interromper o ciclo dos coccídeos, em todas as fases do desenvolvimento, inibindo enzimas da cadeia respiratória e da síntese de pirimidina.

Indicações:

Agecox Neo é utilizado para prevenção e tratamento dos sinais clínicos da coccidiose (*Isospora suis*), em leitões a partir de 1 dia.

Posologia e modo de usar:

Armar a válvula injetora, girando o êmbolo no sentido indicado (anti-horário). Pressione o êmbolo várias vezes até que a válvula esteja repleta, ou seja, de forma que o produto apareça na parte superior do bico dosador. Realize a contenção adequada e insira o bico dosador na boca do animal, mantenha o frasco inclinado. **Utilizar dose única, de 1 mL de Agecox Neo**

70 mm

70 mm

para um animal de 1,250 kg de peso vivo. Conforme tabela abaixo:

Produto	Dosagem	Tempo de Tratamento	Via de Administração	Período de carência
Agecox Neo	20-40 mg/kg 1mL para leitão de 1,250 kg	Dose Única	Via Oral	Abate: Após 65 dias

Precauções:

Agitar bem o frasco antes de usar.

Uso exclusivo em animais.

Obedecer o modo de utilização do produto.

Somente o Médico Veterinário está apto a fazer alterações na dosagem do produto.

Contraindicações:

Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido.

Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto.

Efeitos adversos:

Pode ocorrer vômitos; nesse caso, administrar novamente o produto.

Apresentação:

Frasco na apresentação de 100 mL.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Após abertura do frasco, o conteúdo deve ser utilizado em até 30 dias.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura
sob o nº SP 000292-5.000023 em 08/06/2020.

Responsável Técnico:
Vânia Nazaré Alves de Carvalho
CRF-SP 32.871



Proprietário e Fabricante:
União Química Farmacêutica Nacional S/A.
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, nº 90
Embu-Guaçu – São Paulo – CEP: 06900-000
DDG: 0800 701 1799 - CNPJ: 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

4021580 - 90x150 mm - Lacteus 670



70 mm

70 mm