



# Mectimax Plus<sup>®</sup> Pasta

Ivermectina  
Pamoato de Pirantel  
**Uso Veterinário**

**ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA**  
**EQUÍDEOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 21 DIAS**  
**APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Ivermectina .....	0,40 g
Pamoato de Pirantel .....	38,30 g
Excipiente .....q.s.p .....	100,00 g

#### Informações técnicas:

A ivermectina é uma lactona macrocíclica do grupo das avermectinas, e atua por meio da potencialização do ácido gama-aminobutírico (GABA) no cordão nervoso ventral dos parasitas, causando paralisia flácida. O pirantel é um princípio ativo do grupo das pirimidinas, que atua como agonista colinérgico e provoca excitação com posterior morte dos parasitas por paralisia espástica. A ivermectina possui amplo espectro de ação para vermes redondos, enquanto o pirantel possui atividade contra vermes redondos e vermes chatos. Assim, a associação entre a ivermectina e o pirantel permite que Mectimax Plus Pasta alcance um amplo espectro de ação, abrangendo os principais parasitas internos dos equinos.

#### Indicações:

Indicado para o controle e tratamento das verminoses gastrintestinais que parasitam os equinos, asininos e muare. Mectimax Plus Pasta usualmente é ativo contra os seguintes helmintos:

- Grandes Estrongilídeos: Adultos e estágios arteriais de *Strongylus vulgaris*, adultos e estágios tissulares de *S. edentatus*, adultos de *S. equinus* e *Triodontophorus* spp.
- Pequenos Estrongilídeos: Adultos e larvas de 4º estágio de *Cyathostomum* spp, *Cylicocyclyus* spp, *Cylicostephanus* spp, *Cylicodontophorus* spp e *Cyalocephalus* spp.
- Outros vermes redondos: Formas adultas de *Habronema muscae*, *Trichostrongylus axei* e *Strongyloides westeri*. Adultos e imaturos de *Oxyuris equi*. Adultos, formas migratórias (L3) e imaturos (L4) de *Parascaris equorum* e microfilárias de *Onchocerca* spp.
- Vermes Pulmonares: Adultos e larvas de 4º estágio de *Dictyocaulus arnfieldi*.
- Gasterófilos: Estágios gástricos e orais de *Gasterophilus* spp.
- Dermatoses causadas por larvas cutâneas de *Habronema* e *Draschia* spp (feridas de verão ou esponjas).
- Cestódeos (Tênia): *Anoplocephala perfoliata*, *Anoplocephala magna*, *Paranoplocephala mamillana*.

#### Forma de Uso:

- Observe a graduação existente no êmbolo da seringa.
- Girar o anel, ajustando-o no êmbolo de acordo com o peso do animal a ser tratado.
- Introduzir a extremidade da seringa na boca do animal, pressionar o êmbolo até o anel, depositando a pasta sobre a língua, sempre em direção ao fundo da boca.

**Tabela de Dosificação:**

A dose prescrita é de 200 mcg de IVERMECTINA por kg de peso e de 6,6 mg de Pirantel base por kg de peso em DOSE ÚNICA.

Peso	Quantidade de Produto
Até 100 kg	5,0 g
Até 200 kg	10,0 g
Até 300 kg	15,0 g
Até 400 kg	20,0 g
Até 500 kg	25,0 g

**Observação:** Em infecções agudas por Cestódeos, recomendamos duplicar a dose, sabendo que a Ivermectina não apresenta nenhuma toxicidade na dose de 400 mcg/kg de peso.

**Período de Carência:** Aos equídeos que se destinarem ao consumo humano, suspender o tratamento 21 dias antes do abate.

**Precauções:**

- Não dar água de beber ao animal imediatamente após a administração do produto.
- Manipular o produto com cuidado; não beber, não fumar ou comer durante sua administração.
- As embalagens vazias devem ser adequadamente destruídas, evitando contaminar o meio ambiente.

**Contraindicações:** O produto pode ser administrado em equídeos de todas as idades, bem como em potros lactentes, fêmeas prenhes ou garanhões em cobertura, dispensando dieta alimentar antes ou depois do tratamento.

**Interações Medicamentosas:**

**Mectimax Plus Pasta** não deve ser administrado simultaneamente com outros fármacos com mesmo mecanismo de ação, como por exemplo, inseticidas neuro-bloqueadores, devido ao risco de uma exacerbação do efeito no animal hospedeiro. Igualmente, o pirantel não deve ser administrado com vermífugos a base de piperazina, por apresentar ação antagonista a esta droga.

**Apresentação:** Seringa plástica descartável, com êmbolo graduado, contendo 25 g do produto. Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871  
Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.428 em 16/12/2002.



Proprietário e Fabricante:  
**União Química Farmacêutica Nacional S/A.**  
R. Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90  
Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-000  
DDG: 0800 701 1799 - CNPJ: 60.665.981/0001-18  
® Marca Registrada - Indústria Brasileira