

Prednon®

Prednisolona

**Anti-inflamatório esteroideal
para cães**

Uso veterinário



Fórmula

Cada frasco de Prednon 4 mg/mL contém:

Fosfato Sódico Prednisolona 5,380 mg

Veículo (*) q.s.p...1,000 mL

***Contém palatibilizante**

Informações Técnicas

Prednon tem como princípio ativo a prednisolona, um glicocorticoide sintético com propriedades anti-inflamatória e imunomoduladora. Como um receptor glicocorticoide agonista, a prednisolona se liga a receptores glicocorticóides intracelulares específicos e resulta em um complexo receptor-ligante a ser translocado aos núcleos onde se inicia a transcrição de genes responsivos a glicocorticóides como várias citocinas e lipocortinas.

As lipocortinas inibem a fosfolipase A2, bloqueando a liberação de ácido aracônico pela membrana fosfolipídica, prevenindo a síntese de prostaglandinas e leucotrienos, ambos potentes mediadores da inflamação. Esse agente também diminui o número de linfócitos circulantes, induz a diferenciação celular, e estimula a apoptose em populações de células tumorais sensíveis.

Indicações

Prednon trata-se de um anti-inflamatório esteroideal indicado para cães.

Posologia e modo de usar

O produto deve ser administrado exclusivamente pela via oral.

Administrar o medicamento uma vez ao dia, de acordo com a tabela abaixo:

Espécie	Dosagem	Tratamento
Cães	Prednisolona 4 mg/ mL	Dose de 0,5 mg/kg a 1,0 mg/kg a cada 24 horas

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro. Em uso prolongado, acima de 7 dias, a dose diária deve ser reduzida gradativamente até o fim do tratamento ou até alcançar a dose mínima de manutenção efetiva para condições crônicas.

Contraindicações

O produto não deve ser utilizado em cães com infecções fúngicas sistêmicas.

Animais com risco de desenvolver diabetes mellitus ou que sofram de doença cardiovascular, devem receber glicocorticoides cautelosamente, devido a potente ação hiperglicemiante.

Interações medicamentosas

O uso concomitante com a anfoterecina B e com diuréticos depletos de potássio, como a furosemida, pode resultar em hipocalcemia. Ainda secundário



70 mm

à hipocalcemia, a administração concomitante a glicosídeos cardíacos, como a digoxina, pode aumentar o risco de arritmias e de intoxicação digitálica.

Salicilatos (aspirina) podem ter seu nível sérico reduzido pelo uso frequente de glicocorticoides.

Ajustes de dose podem ser necessários em casos de uso concomitante à ciclofosfamida, visto que os glicocorticoides podem diminuir o metabolismo hepático deste fármaco. Da mesma forma, o uso concomitante dos glicocorticoides com a ciclosporina pode aumentar os níveis séricos de ambas as medicações devido à inibição do metabolismo hepático de ambas.

Medicações anticolinesterásicas como neostigmina, em associação com glicocorticoides, podem levar à fraqueza muscular, portanto, recomenda-se descontinuar o uso, no mínimo 24 horas antes da administração dos glicocorticoides.

Fármacos como efedrina, fenitoína, rifampicina e fenobarbital podem aumentar o metabolismo dos glicocorticóides o que resulta no aumento da sua eliminação. Quando administrados com o cetoconazol, pode diminuir o metabolismo dos glicocorticoides.

O metabolismo dos glicocorticoides também pode ser alterado pelo uso do mitotano.

Os efeitos dos glicocorticoides podem ser potencializados pelos estrógenos.

Requerimentos de insulina podem ser aumentados em pacientes recebendo glicocorticoides.



70 mm

A administração de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) juntamente com glicocorticoides, pode resultar em aumento dos efeitos adversos gastrointestinais.

Não se recomenda o uso de vacinas com agentes atenuados em animais recebendo glicocorticoides em doses imunossupressoras.

Efeitos adversos

O risco de efeitos adversos está relacionado principalmente ao uso prolongado e de altas doses dos glicocorticoides.

Os efeitos adversos já relatados em cães são: pelagem seca, letargia, ganho de peso, cansaço, vômito, diarreia, aumento de enzimas hepáticas, pancreatite, ulceração do trato gastrointestinal, lipidemias, ativação ou piora do quadro de diabetes mellitus, perda de massa muscular e mudanças de comportamento (depressão, letargia e agressividade).

Com exceção de poliúria, polidipsia e polifagia, os efeitos adversos associados com a terapia anti-inflamatória são relativamente incomuns.

Eventos adversos associados com doses imunossupressoras são mais comuns e potencialmente mais severas.

Intoxicação e Superdosagem

Superdosagem de glicocorticoides, quando utilizados de forma exclusiva, não são prováveis de causar efeitos nocivos, mas alterações gastrointestinais já foram descritas em cães. Nestes casos, recomenda-se proceder com tratamento suporte.

Precauções

Produtos de uso veterinário devem ser mantidos fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas ou produtos de higiene pessoal.

O produto não deve ser usado em filhotes, fêmeas prenhes e lactantes. O medicamento não deve ser utilizado nesta categoria.

Apresentação

Frascos de 30 mL

Após o aberto o produto deverá ser utilizado em até 60 dias.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porém foram conduzidos estudos pela empresa fabricante que demonstraram que o produto apresenta as características desejadas e necessárias de eficácia e segurança para a indicação a que se destina obtendo, dessa forma, emissão de Licença Provisória.

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 36/2021, em 02/09/2021.

70 mm



Responsável Técnico:
Elvira Aparecida Centeio
CRF/SP 11.142

Proprietário:
INOVAT INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1.555
Guarulhos - SP - CEP 07112-070
CNPJ 27.864.378/0001-90
Indústria Brasileira

Fabricado por:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90
Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-095
DDG 0800 701 1799
CNPJ 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

70 mm

