

ANTIMICROBIANO E ANTI-INFLAMATÓRIO PARA BOVINOS E SUÍNOS

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 6 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO, DESTE PRODUTO.

SUÍNOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 6 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Enrofloxacin	10,00 g
Piroxicam	1,20 g
Veículo q.s.p	100,00 mL

Informações técnicas:

A enrofloxacin pertencente a classe das fluorquinolonas, é um agente bactericida e sua atividade é dependente da concentração. Atua inibindo a DNA girase da bactéria, interferindo no seu metabolismo. Demonstra atividade tanto para agente gram negativos, como para gram positivos.

O piroxicam, derivado do oxicam, é um anti-inflamatório não esteroidal que possui ação analgésica, anti-inflamatória e antipirética. Atua bloqueando a enzima ciclooxigenase (COX-1 e COX-2), inibindo a ativação dos neutrófilos e a síntese de prostaglandinas.

A ação anti-inflamatória do piroxicam, atuando no local da infecção, facilita a ação da enrofloxacin como agente antibacteriano.

Indicações:

Zelotril Plus é indicado no tratamento de infecções dos bovinos e suínos causadas por bactérias gram negativas e gram positivas:

Bovinos:

Clostridium perfringens, Corynebacterium bovis, Dichelobacter nodosus, Escherichia coli, Fusobacterum necrophorum, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonella Dublin, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus uberis e Trueperella pyogenes.

Suínos:

Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinobaculum suis, Bordetella bronchiseptica, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Erysipelotrix rhusiopathiae, Escherichia coli, Haemophilus parasuis, Klebsiella pneumoniae, Pasteurella multocida Tipo A, Pasteurella multocida Tipo D, Salmonella Choleraesuis, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus, Staphylococcus hyicus, Streptococcus suis e Trueperella pyogenes.

Espécies	Dose única	Via de Administração
Bovinos e Suínos	1mL a cada 10Kg	Intramuscular

Tratamento em dose única.

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro a critério do médico veterinário.

Contraindicações:

Não utilizar medicamentos após a data de vencimento.

Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Interações medicamentosas:

-Administração concomitante a antibióticos como aminoglicosídeos, cefalosporinas de 3^o geração e penicilinas pode apresentar sinergismo, no entanto, com algumas bactérias, em especial *Pseudomonas aeruginosa*, pode não ocorrer. Pode aumentar o risco de nefrotoxicidade.

-Administração concomitante a ciclosporinas pode exacerbar a nefrotoxicidade e reduzir o metabolismo das ciclosporinas (de uso sistêmico).

-Administração concomitante de piroxicam a anticoagulantes pode aumentar o possível risco de sangramento.

-Uso concomitante de piroxicam ao ácido acetilsalicílico e a bifosfonatos (alendronato) podem aumentar o risco de eventos adversos gastrointestinais.

-Em caso de administração com cisplatina pode potencializar a toxicidade renal da mesma.

Efeitos adversos:

Podem ocorrer náuseas, vômitos, diarreia e anorexia. Em animais sensíveis podem ocorrer prurido e urticárias.

Precauções:

- Quando o volume do produto a ser aplicado ultrapassar 10mL, recomenda-se dividir a quantidade em dois ou mais pontos de aplicação.

- Uso exclusivo em bovinos e suínos na posologia indicada em bula.

- Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.

- Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo.

- Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.

- Manter o produto em sua embalagem original.

- Manter o produto livre de contaminações externas.

- A segurança do produto não foi avaliada em animais jovens, fêmeas prenhes ou em lactação.

Apresentação:

Frasco ampola contendo 50mL e 100mL.

Conservação:

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Período de utilização: Após abertura do frasco, o conteúdo deve ser utilizado em 30 dias.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº SP 000292-5.000034 em 23/12/2013



UNIÃO QUÍMICA
FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90
Embu-Guaçu – SP – CEP: 06900-095
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

4033384 - 90 X150 mm - PHC 1051



70 mm

70 mm