Providean®
VIRATEC

LINHA AGENER
VACINAS

PROTEÇÃO
PARA TODA A **VIDA.**

TECNOVAX

AGENER UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

Providean®
VIRATEC

A linha Providean® Viratec chega ao Brasil para trazer liberdade e segurança ao Médico Veterinário na escolha do protocolo mais adequado para o seu paciente. Com uma linha ampla e diferenciada, a Agener contribui para a construção de uma relação saudável entre o Médico Veterinário, paciente e família, priorizando a corresponsabilidade nesse momento tão frágil e tão importante que é a imunização do filhote.

Levar informação, segurança e imunização é o nosso propósito. Acreditamos que, juntos, podemos criar um ambiente saudável para a vida dos animais e também da sociedade.

AGENER UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

Providean® VIRATEC

A vacina para toda a vida do seu animal.

DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS DA PROVIDEAN® VIRATEC

- **NÃO POSSUI ADJUVANTES** - reduz os riscos de reações pós-vacinais e dor no local da aplicação.
- **ALTOS TÍTULOS VIRAIS** - alta massa antigênica com baixa passagem de atenuação, para estimular uma resposta imunológica rápida e eficiente. Contribui para a diminuição da janela de suscetibilidade imunológica dos filhotes.
- **ALTOS TÍTULOS DE PARVOVÍRUS CANINO (CPV-2)** - proteção contra as variedades de campo 2a, 2b e 2c.
- **CEPA DE CINOMOSE *ONDERSTEPOORT*** - segurança e estímulo da imunidade protetora.
- **VACINAS COM DIFERENTES COMBINAÇÕES DE CEPAS E ALTOS TÍTULOS** - para melhor adequação ao programa vacinal definido pelo Médico Veterinário, de acordo com as necessidades de cada animal. Protegem contra um maior número de doenças.
- **VIRATEC 10 CVL - QUATRO SOROVARES CONTRA LEPTOSPIROSE** - uma das principais zoonoses emergentes que ameaça a saúde dos animais e da sociedade.
- **PUREZA MÁXIMA E SEGURANÇA** - ultrafiltração molecular para a eliminação de proteínas que possam causar reações indesejadas.

AGENER UNIÃO SAÚDE ANIMAL

POR QUE VACINAR?

O principal objetivo da vacinação é induzir a imunidade do animal e, assim, reduzir a incidência e auxiliar na prevenção de doenças infecciosas.

Quanto maior o número de animais vacinados em uma população, menor a chance de transmissão de doenças.

Para que haja o controle das doenças infecciosas em uma população, pelo menos 70% dos animais devem ser vacinados, garantindo assim, a imunidade de rebanho.

Todos os animais devem receber o benefício da vacinação.



QUANDO COMEÇAR?

Os cães recém-nascidos não possuem maturidade imunológica. Por isso, nas primeiras horas de vida, devem ingerir o colostro que contém anticorpos maternos para sua proteção (imunidade passiva).

A quantidade de anticorpos maternos que protegerá os filhotes é proporcional à imunidade da mãe e à quantidade de colostro ingerido.

A concentração dos anticorpos maternos (AM) declinam progressivamente e podem permanecer por 16 semanas de vida ou mais (Parvovirose), de acordo com o agente infeccioso.

O Grupo de Diretrizes de Vacinação da WSAVA recomenda que a vacinação essencial deve ser iniciada em cães a partir de 6 a 8 semanas de idade e finalizada após as 16 semanas de idade.[1] Portanto, o número de vacinas aplicadas no filhote dependerá da idade na qual a vacinação é iniciada e do intervalo entre as doses.

Para cães filhotes, a vacina contendo altos títulos de vírus da Cinomose Canina (CDV) e Parvovírus Canino tipo 2 (CPV-2), pode ser administrada a partir da 4ª semana de idade.

A presença dos AM interfere na resposta vacinal e, por este motivo, recomenda-se a última dose da vacina em animais com mais de 16 semanas de vida. Para filhotes que vivem em regiões com alto risco de infecção pelo vírus da Cinomose Canina e Parvovirose, recomenda-se a última dose da vacina com 18 a 20 semanas de idade.[2]

1-https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/08/Recommendations-on-vaccination-for-Latin-American-small-animal-practitioners-Portuguese.pdf.**2**-https://www.aaha.org/globalassets/02-guidelines/2022-aaha-canine-vaccination-guidelines/resources/2022-aaha-canine-vaccinations-guidelines.pdf

AGENER UNIÃO SAÚDE ANIMAL

Providean®
VIRATEC DP

Vacina contra Cinomose e Parvovirose Canina

ESPÉCIE INDICADA:

Canina.

APRESENTAÇÃO:

Caixas contendo cinco frascos com fração liofilizada (antígenos atenuados), acompanhados de cinco frascos de 0,5 mL da fração diluente estéril.

COMPOSIÇÃO:

Cada dose de vacina reconstituída de 0,5 mL contém vírus atenuados com título mínimo (DICT50%): Cinomose $\geq 10^5$ e Parvovírus Canino $\geq 10^7$.

CONSERVAÇÃO:

Conservar em temperatura entre 2ºC a 8ºC, devendo ser protegido da luz solar e do calor. Não congelar. Uma vez reconstituída, a vacina deve ser utilizada imediatamente.

Outras vacinas
Dose 1 mL

Viratec® DP
microdose 0,5 mL

MICRODOSE

- Menor risco de reações adversas.
- Maior segurança.

} FRAÇÃO **NÃO ANTIGÊNICA**
} FRAÇÃO **ANTIGÊNICA**

Manter refrigerado entre 2 a 8°C

PRODUTO IMPORTADO.

INDICAÇÕES DE USO E ADMINISTRAÇÃO:

Indicado para a vacinação de cães saudáveis como auxiliar na prevenção da Parvovirose e Cinomose, com adequado estado nutricional, sem febre e desparasitados, após minucioso exame clínico realizado por um Médico Veterinário. Com uma agulha e seringa estéril, reconstituir a fração liofilizada com o diluente que acompanha o produto, agitar até obter uma suspensão homogênea. Aplicar todo o conteúdo de 0,5 mL pela via subcutânea.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO SUGERIDO:

Providean® Viratec DP é uma vacina com alto título viral, indicada para o início da vacinação em filhotes de cães, a partir de 4 semanas de vida. Recomenda-se um programa de vacinação com no mínimo três doses, mantendo um intervalo de 2 a 4 semanas entre cada uma, até as 16 semanas de vida ou mais. Evitar o contato do animal com fontes potenciais de contaminação até completar o esquema de vacinação. Revacinar anualmente. O esquema de vacinação deve ser adaptado a critério do Médico Veterinário, de acordo com as condições específicas de cada animal, região e/ou ambiente.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO.

AGENER UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

Providean® VIRATEC 6 CV

Vacina contra Cinomose, Parvovirose, Hepatite Infecciosa e Doença Respiratória causada pelo Adenovírus tipo 2, Parainfluenza e Coronavirose.

ESPÉCIE INDICADA:

Canina.

COMPOSIÇÃO:

Cada dose de vacina reconstituída de 1 mL contém vírus atenuados com título mínimo (DICT50%): Parvovírus Canino ($\geq 10^{6,5}$), Cinomose ($\geq 10^{3}$), Adenovírus Canino Tipo 2 ($\geq 10^{2,50}$), Parainfluenza Canina ($\geq 10^{5}$) e Coronavírus Canino inativado ($\geq 10^{5}$).

APRESENTAÇÃO:

Caixas contendo 25 frascos com fração liofilizada (antígenos atenuados contra Parvovírus Canino, vírus da Cinomose Canina, Adenovírus tipo 2 e Parainfluenza Canina), acompanhados de 25 frascos de 1 mL da fração líquida (antígenos inativados contra Coronavírus Canino).

CONSERVAÇÃO:

Conservar em temperatura entre 2ºC a 8ºC, devendo ser protegido da luz solar e do calor. Não congelar. Uma vez reconstituída, a vacina deve ser utilizada imediatamente.

Manter refrigerado entre 2 a 8°C

PRODUTO IMPORTADO.

INDICAÇÕES DE USO E ADMINISTRAÇÃO:

Indicado para a vacinação de cães saudáveis como auxiliar na prevenção da Cinomose, Parvovirose, Hepatite Infecciosa Canina, doença respiratória causada pelo Adenovírus tipo 2, Parainfluenza, Coronavirose Canina, com adequado estado nutricional, sem febre e desparasitados, após minucioso exame clínico realizado por um Médico Veterinário. Com uma agulha e seringa estéril, reconstituir a fração liofilizada com o diluente que acompanha o produto, agitar até obter uma suspensão homogênea. Aplicar todo o conteúdo pela via subcutânea ou intramuscular.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO SUGERIDO:

Em cães a partir das 6 semanas de vida, recomenda-se um programa de vacinação com no mínimo três doses, mantendo um intervalo de 3 a 4 semanas entre cada uma, até as 16 semanas de vida ou mais. Evitar o contato do animal com fontes potenciais de contaminação até completar o esquema de vacinação. Revacinar anualmente. O esquema de vacinação deve ser adaptado a critério do Médico Veterinário de acordo com as condições específicas de cada animal, região e/ou ambiente.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO.

AGENER UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

Providean® VIRATEC 10 CVL

Vacina contra Cinomose, Parvovirose, Hepatite Infecciosa e Doença Respiratória causada pelo Adenovírus Tipo 2, Parainfluenza, Coronavirose e Leptospirose Canina.

Espécie indicada:

Canina.

COMPOSIÇÃO:

Cada dose de vacina reconstituída de 1 mL contém vírus atenuados com título mínimo (DICT50%): Parvovírus Canino ($\geq 10^{6,5}$), Cinomose ($\geq 10^{4}$), Adenovírus Canino tipo 2 ($\geq 10^{3}$), Parainfluenza Canina ($\geq 10^{5}$), Coronavírus Canino inativado ($\geq 10^{5}$) e bacterinas com título mínimo de $\geq 10^{7}$ por sorovar de: *Leptospira interrogans* sorovar Icterohaemorrhagiae, *Leptospira interrogans* sorovar Canicola, *Leptospira interrogans* sorovar Pomona *e Leptospira kirschneri* sorovar Grippotyphosa.

APRESENTAÇÃO:

Caixas contendo 25 frascos com fração liofilizada (antígenos atenuados contra Parvovírus Canino, vírus da Cinomose Canina, Adenovírus tipo 2 e Parainfluenza Canina), acompanhados de 25 frascos de 1 mL da fração líquida (antígenos inativados contra Coronavírus Canino e *Leptospiras* sorovares Canicola, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa e Pomona).

CONSERVAÇÃO:

Conservar em temperatura entre 2ºC a 8ºC, devendo ser protegido da luz solar e do calor. Não congelar. Uma vez reconstituída, a vacina deve ser utilizada imediatamente.

Manter refrigerado entre 2 a 8°C

PRODUTO IMPORTADO.

INDICAÇÕES DE USO E ADMINISTRAÇÃO:

Indicado para a vacinação de cães saudáveis como auxiliar na prevenção da Cinomose, Parvovirose, Hepatite Infecciosa Canina, doença respiratória causada pelo Adenovírus tipo 2, Parainfluenza, Coronavirose Canina e Leptospirose Canina, com adequado estado nutricional, sem febre e desparasitados, após minucioso exame clínico realizado por um Médico Veterinário. Com agulha e seringa estéril, reconstituir a fração liofilizada com o diluente que acompanha o produto, agitar até obter uma suspensão homogênea. Aplicar todo o conteúdo pela via subcutânea ou intramuscular.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO SUGERIDO:

Em cães a partir de 6 semanas de vida, recomenda-se um programa de vacinação com no mínimo três doses, mantendo um intervalo de 3 a 4 semanas entre cada uma, até as 16 semanas de vida ou mais. Evitar o contato do animal com fontes potenciais de contaminação até completar o esquema de vacinação. Revacinar anualmente. O esquema de vacinação deve ser adaptado a critério do Médico Veterinário, de acordo com as condições específicas de cada animal, região e/ou ambiente.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO.

AGENER UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

CERTIFICADO DIGITAL DE VACINAÇÃO AGENER

A Agener e a Tecnovax desenvolveram um aplicativo exclusivo para que os Médicos Veterinários possam acompanhar a vacinação dos seus pacientes, com notificações sobre as próximas datas de vacinação e o melhor acompanhamento de todo o processo de imunização dos animais.

Essa plataforma também permite que os Médicos Veterinários, após o cadastro, participem do **Programa de Suporte Técnico para a linha Providean® Viratec** e recebam o respaldo da Agener, caso necessitem, desde que seja utilizado o protocolo vacinal recomendado e esteja de acordo com o regulamento.

CONVERSE
COM UM
REPRESENTANTE
AGENER E
SAIBA MAIS.

ORIENTAÇÕES E CUIDADOS PÓS-VACINAIS

Durante todo o período de vacinação, até pelo menos duas semanas, após a última dose, o ideal é que o filhote permaneça isolado, sem contato com ambientes públicos e animais com vacinações desatualizadas ou com histórico de saúde desconhecido.

As reações pós-vacinais podem ocorrer nas primeiras 24 horas e geralmente são leves e transitórias.

OS PROPRIETÁRIOS DEVEM ESTAR CIENTES DESTAS POSSIBILIDADES:

- Dor no local da aplicação.
- Formação de nódulo no local, que regride progressivamente.
- Febre baixa.
- Sonolência e prostração.

Já as reações alérgicas (hipersensibilidade do tipo I) como o edema facial, urticárias e também reações graves (choque anafilático) são raras. Caso ocorra, o animal deverá retornar, no mesmo momento, para a clínica ou hospital veterinário para o tratamento adequado.

AGENER UNIÃO SAÚDE ANIMAL

SUGESTÃO AGENER DE PROTOCOLO VA

O protocolo vacinal deve ser individual e definido de acordo

ESTILO DE VIDA	4 semanas	6 a 7 semanas
ALTO RISCO **Ambiente:** Pode ter contato com área externa da casa e locais públicos (como praças, ruas, shopping, pet shop, banho e tosa). Possibilidade de viajar com os proprietários. Acesso a locais com água de chuva, rios e lagoas. Locais com espécies rurais ou silvestres (fazenda, sítio). **Contato social:** Contato pode ocorrer com animais sem histórico de saúde/vacinação. Mais de 1 contactante ou 1 único contactante que esteja com vacinação desatualizada.	Providean® VIRATEC DP	Providean® VIRATEC 6 CV
MÉDIO RISCO **Ambiente:** Casa, ambientes externos da casa (quintal, gramado). Sem acesso a locais públicos. **Contato social:** 1 contactante (animal com histórico de saúde, vacinado, vermifugado e sem ectoparasitas).	Providean® VIRATEC DP	Providean® VIRATEC 6 CV
BAIXO RISCO **Ambiente:** Interno, apartamento, sem acesso a quintais, gramados ou áreas de difícil desinfecção. Sem acesso a locais públicos. **Contato social:** Único animal na casa. Sem contactantes.	Providean® VIRATEC DP Opcional	

Cães sem histórico vacinal e maiores de 18-20 semanas de idade: 2 doses de Providean® Viratec 10 CVL, com intervalos de 3 a 4 semanas entre elas. Após, recomenda-se vacinação anual.

CINAL NA PRIMOVACINAÇÃO DE CÃES

com a idade do animal, estilo de vida e o risco de infecção.



*Idade mínima para a última dose do protocolo do filhote de acordo com os guias mundiais de vacinação em cães.

**Áreas de alto risco de infecção, como o Brasil, é recomendada a última dose do protocolo do filhote entre 18 e 20 semanas de idade, de acordo com o *AAHA Canine Vaccination Guidelines 2022*.

AGENER UNIÃO SAÚDE ANIMAL

LINHA DE VACINAS SEM ADJUVANTES

Providean® VIRATEC

Indicação	Idade do animal	Proteção contra as doenças
Providean® VIRATEC DP	**4 semanas** ou mais	· Cinomose · Parvovirose
Providean® VIRATEC 6 CV	**6 semanas** ou mais	· Cinomose · Parvovirose · Hepatite Infecciosa Canina · Doença Respiratória causada pelo Adenovírus tipo 2 · Parainfluenza · Coronavirose Canina

Providean® VIRATEC 10 CVL	**6 semanas** ou mais	· Cinomose
		· Parvovirose
		· Hepatite Infecciosa Canina
		· Doença Respiratória causada pelo Adenovírus tipo 2
		· Parainfluenza
		· Coronavirose Canina
		· Leptospirose Sorovares
		  · Icterohaemorrhagiae
		  · Canicola
		  · Pomona
		  · Grippotyphosa

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO.

5007774

TECNOVAX

Siga agener.oficial

www.agener.com.br

SAC: 0800 701 1799

AGENER UNIÃO SAÚDE ANIMAL

Consulte sempre um Médico Veterinário. Material dirigido direto e unicamente a profissionais Médicos Veterinários e equipe de vendas.