A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO NAS 6 PRIMEIRAS SEMANAS.

COMECE UM PROTOCOLO VACINAL DE ACORDO COM A ROTINA DE CADA PET PARA PREVENIR DOENÇAS E ZOONOSES.

LINHA AGENER
VACINAS

PROTEÇÃO
PARA TODA A **VIDA.**



85%
da população brasileira não vacina seus pets

Pets vacinados nos últimos 12 meses em cada região

Fonte: Comac, OUT/23

AGENER UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

O QUE É VACINAÇÃO?

Conceito de vacinação está atrelado à fabricação, conservação e administração da vacina, ou seja, tudo que diz respeito ao produto. Já no conceito imunização, refere-se a tudo que está atrelado ao pet, receptor da vacina (estado de saúde, onde vive, resposta imune e a não exposição precoce à doença) e, claro, a escolha do protocolo ideal pelo Médico Veterinário.

O desenvolvimento do sistema imune do pet inicia dentro da barriga da mãe, e o fornecimento do colostro **pode** ou **não** ser suficiente para o combate a algumas doenças. O protocolo vacinal deve terminar com **16 semanas ou mais**, para que a presença dos anticorpos maternos, existentes no colostro, não cause competitividade ou inativação dos anticorpos produzidos pela vacina.

Sendo assim, saber quando iniciar e principalmente quando terminar o protocolo vacinal, pode ser um fator determinante para o melhor desempenho da vacina escolhida.

VACINAÇÃO X IMUNIZAÇÃO

VACINAÇÃO
- PRODUÇÃO VACINAL
- CONSERVAÇÃO
- ADMINISTRAÇÃO

IMUNIZAÇÃO
- ANIMAL SAUDÁVEL
- PROTOCOLO ADEQUADO
- NÃO CONTATO COM OS AGENTE PATOGÊNICOS
- RESPOSTA INDIVIDUAL



Fonte: WASAVA, 2020

QUANDO VACINAR?

A duração da imunidade passiva ou dos anticorpos, enviados pela mãe por meio do período gestacional e colostro, é diferente de acordo com a doença, e o início vacinal faz relação com a durabilidade em questão e a, possível, exposição à doença no início da vida do pet.

DOENÇA	DURAÇÃO DA IMUNIDADE (SEMANAS)
Cinomose	9 - 12
Parvovirose	10 - 14
Hepatite Infecciosa Canina	9 - 12
Leptospirose	12
Raiva	12

Fonte: AHAA, 2022

Segundo COLAVAC e FIAVAC, não há necessidade da exposição à leptospirose antes das 10 a 12 semanas de vida do pet, mesmo em áreas endêmicas.

Assim como a vacina de raiva já segue o protocolo de início a partir de 12 semanas de vida, a leptospirose seguiria um padrão semelhante, imunizando o pet quando seu organismo está imunocompetente à resposta vacinal e minimizando reações adversas promovidas pela leptospira.

GUIDELINES

Clínica Veterinária

COLAVAC/FIAVAC - Estratégias para vacinação de animais de companhia: cães e gatos.

Doença (antígeno vacinal)	Vacinação inicial (< 16 semanas)	Vacinação inicial (> 16 semanas)	Revacinação (reforços)
Cinomose (CDV) Vacina infectante (viva atenuada ou recombinante), parenteral.	Início entre 6-8 semanas, com repetições a cada 3-4 semanas, sendo a última dose após 16 semanas.	2 doses com intervalo de 3-4 semanas	Com 1 ano de idade, então a cada 2 anos.
Parvovirose (CPV-2) Vacina infectante (viva atenuada), parenteral.	Início entre 6-8 semanas, com repetições a cada 3-4 semanas, sendo a última dose após 16 semanas.	2 doses com intervalo de 3-4 semanas	Com 1 ano de idade, então a cada 2 anos.
Hepatite infecciosa canina (CAV-2) Vacina infectante (viva atenuada) parenteral.	Início entre 6-8 semanas, com repetições a cada 3-4 semanas, sendo a última dose após 16 semanas.	2 doses com intervalo de 3-4 semanas	Com 1 ano de idade, então a cada 2 anos.
Raiva *(vírus rábico)* Vacina não infectante (morta), parenteral.	Início a partir de 12 semanas, dose única.	Dose única	Com 1 ano de idade, então a cada 1-3 anos, conforme legislação vigente.
Leptospirose *(Leptospira interrogans sorovares canicola, icterohaemorrhagiae, pomona e grippotyphosa)*	Início entre 10-12 semanas, com repetições a cada 3-4 semanas, sendo a última dose após 16 semanas.	2 doses com intervalo de 3-4 semanas	Com 1 ano de idade, então anualmente.

Fonte: COLAVAC/FIAVAC, 2016.

Antígenos na medida e menor reação local

AGENER UNIÃO SAÚDE ANIMAL

Providean® VIRATEC

SUGESTÃO AGENER DE PROTOCOLO VACINAL NA PRIMOVACINAÇÃO DE CÃES

O protocolo vacinal deve ser individual e definido de acordo com a idade do animal, estilo de vida e o risco de infecção.

- **Sem adjuvantes:** menor risco de reações adversas.
- **Altos títulos virais:** redução da janela de suscetibilidade.
- **Altos títulos de parvovírus:** maior proteção e segurança.
- **Combinação ideal de cepas vivas atenuadas e inativadas:** maior proteção contra um maior número de doenças.
- **Ultrafiltração molecular:** segurança e pureza máxima.

ESTILO DE VIDA	IDADE									
	4 semanas	6 a 7 semanas	8 semanas	10 semanas	12 semanas	13 semanas	16 semanas*	19 semanas**	20 semanas**	6 meses ou 1 ano (após, revacinação anual)
ALTO RISCO **Ambiente:** Pode ter contato com área externa da casa e locais públicos (como praças, ruas, shopping, pet shop, banho e tosa). Possibilidade de viajar com os proprietários. Acesso a locais com água de chuva, rios e lagoas. Locais com espécies rurais ou silvestres (fazenda, sítio). **Contato social:** Contato pode ocorrer com animais sem histórico de saúde/vacinação. Mais de 1 contactante ou 1 único contactante que esteja com vacinação desatualizada.	Providean VIRATEC DP	Providean VIRATEC 6 CV		Providean VIRATEC 10 CVL		Providean VIRATEC 10 CVL	Providean VIRATEC 10 CVL	Providean VIRATEC 10 CVL		Providean VIRATEC 10 CVL
MÉDIO RISCO **Ambiente:** Casa, ambientes externos da casa (quintal, gramado). Sem acesso a locais públicos. **Contato social:** 1 contactante (animal com histórico de saúde, vacinado, vermifugado e sem ectoparasitas).	Providean VIRATEC DP	Providean VIRATEC 6 CV		Providean VIRATEC 6 CV		Providean VIRATEC 10 CVL	Providean VIRATEC 10 CVL	Providean VIRATEC 10 CVL		Providean VIRATEC 10 CVL
BAIXO RISCO **Ambiente:** Interno, apartamento, sem acesso a quintais, gramados ou áreas de difícil desinfecção. Sem acesso a locais públicos. **Contato social:** Único animal na casa. Sem contactantes.	Providean VIRATEC DP Opcional		Providean VIRATEC 6 CV		Providean VIRATEC 10 CVL		Providean VIRATEC 10 CVL		Providean VIRATEC 10 CVL	Providean VIRATEC 10 CVL

Individualizar as necessidades e estilo de vida do pet facilita na escolha do melhor protocolo vacinal, garantindo segurança e saúde para os pets.

6 semanas
de vida ou mais

Proteção contra as doenças:

- Cinomose
- Parvovirose
- Hepatite Infecciosa Canina
- Doença Respiratória causada pelo Adenovírus tipo 2
- Parainfluenza
- Coronavirose Canina

5009141

TECNOVAX

Siga agener.oficial
www.agener.com.br
SAC: 0800 701 1799

Consulte sempre um Médico Veterinário.

AGENER UNIÃO SAÚDE ANIMAL